

THESE

106

POUR LE

DOCTORAT EN MEDECINE

(Diplôme d'Etat)

P A R

APFELBAUM, MARIAN

Interne des Hôpitaux de NICE

Né le 26 Juin 1931 à VARSOVIE (POLOGNE)

Présentée et soutenue publiquement le

CONTRIBUTION à L'ETUDE de

LA REGULATION

DE LA

SECRETION D'ALDOSTERONE

President : Monsieur le Professeur F A U V E R T

THESE

POUR LE

DOCTORAT EN MEDECINE

(Diplôme d'Etat)

P A R

APFELBAUM, MARIAN

Interne des Hôpitaux de NICE

Né le 26 Juin 1931 à VARSOVIE (POLOGNE)

Présentée et soutenue publiquement le

CONTRIBUTION à L'ETUDE de

LA REGULATION

DE LA

SECRETION D'ALDOSTERONE

President : Monsieur le Professeur F A U V E R T



PROFESSEURS HONORAIRES :

MM. AUBIN (A.), BENARD (H.), BROCC (P.), BULLIARD (H.),
 CADENAT (F.), CHABROL (E.), CHAMPY (C.), CHEVALLIER (P.), DEBRE (R.),
 DONZELAT (E.), GASTINEL (P.), GUILLAIN (G.), HALPHEN (E.), HARVIER (P.),
 HAZARD (R.), HEUYER (G.), LANTUEJOL (P.), LAROCHE (G.), LAUBRY (C.),
 LEVY-SOLAL (E.), LIAN (C.), LOEPER (M.), MARION (G.), MATHIEU (P.),
 MOCQUOT (P.), MONDOR (H.), MONOD (R.), MOREAU (R.), OLIVIER (E.), PAS-
 TEUR VALLERY RADOT, PETIT-DUTAILLIS, RICHET (C.), STROHL (A.), TANON (L.).

DOYEN L. BINET
 Membre de l'Institut

ASSESEUR JEAN VERNE

I.- PROFESSEURS

MM.

Anatomie	CORDIER (G.)
" (Prof. à titre personnel)	DELMAS (A.)
Anatomie Pathologique	DELARUE (J.)
Anesthésiologie	BAUMANN (J.)
Bactériologie	FASQUELLE (R.)
Biochimie médicale	JAYLE (M.F.)
" " (Prof. à titre personnel)	SCHAPIRA (G.)
Biologie appliquée à l'Education physique et aux Sports	CHAILLEY-BERT (P.)
Biologie médicale	FAUVERT (R.)
" " (Prof. à titre personnel)	BOURLIERE (F.)
Cancérologie médicale et sociale	BERNARD (J.)
Clinique carcinologique chirurgicale (Institut G. ROUSSY)	REDON (H.)
Clinique cardiologique (Brousseis)	MOUQUIN (M.)
(Beaujon	SICARD (A.)
(Cochin	QUENU (J.)
Cliniques chirurgicales (Hôtel-Dieu	PATEL (J.)
(Saint-Antoine	GOSSET (J.)
(Selpêtrière	MOULONGUET (P.)
Clinique de chirurgie infantile et orthopédique (Enfants-Malades)	FEVRE (M.)
Clinique chirurgicale orthopédique et réparatrice (Cochin)	MERLE d'AUBIGNE (R.)



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Clinique de Chirurgie cardio-vasculaire (Broussais)	MM. GAUDART d'ALLAINES
Clinique de Chirurgie pleuro-pulmonaire (Laënnec)	MATHEY (J.)
Clinique endocrinologique (Pitié)	DECOURT (J.)
Clinique de génétique médicale (Enf. Malades)	LAMY (M.)
Clinique gynécologique (Broca)	FUNCK-BRENTANO (P.)
Clinique des maladies cutanées et syphilitiques (Saint-Louis)	DEGOS (R.)
Clinique des maladies des enfants	CATHALA (J.)
Clinique des maladies infectieuses (Cl. Bernard)	MOLLARET (P.)
Clinique des maladies mentales et de l'encéphale (Sainte-Anne)	DELAY (J.)
Clinique des maladies métaboliques (Necker)	HAMBURGER (J.)
Clinique des maladies du sang (Broussais)	MARCHAL (G.)
Clinique des maladies du système nerveux (Salpêtrière)	ALAJOUANINE (T.)
(Boucicaud	LENEGRE (J.)
(Broussais	SOULIE (P.)
(Cochin	JUSTIN-BESANCON
Cliniques médicales (Hôtel-Dieu	BARIETY (M.)
(Pitié	DREYFUS (G.)
(Saint-Antoine	KOURILSKY (R.)
Clinique médicale d'hydrologie thérapeutique et climatologie (Bichat)	DEBRAY (C.)
Clinique médicale propédeutique (Broussais)	de GENNES (L.de)
Clinique médico-sociale du diabète sucré et des maladies de la nutrition (Hôtel-Dieu)	DEROT (M.)
Clinique de neuro-chirurgie (Pitié)	DAVID (M.)
(Baudelocque)	LACOMME (M.)
Cliniques obstétricales (Foch (Suresnes)	MERGER (R.)
Clinique obstétricale et gynécologique (Port-Royal)	VARANGOT (J.)
Clinique ophtalmologique (Hôtel-Dieu)	RENARD (G.)
Clinique oto-rhino-laryngologique (Lariboisière)	AUBRY (M.)
Clinique de pédiatrie sociale (Enf. Malades)	MARIE (J.)
Clinique de pneumo-phtisiologie (Laënnec)	BERNARD (E.)
Clinique psychiatrique infantile (Salpêtrière)	MICHAUX (L.)
Clinique de rhumatologie médicale et sociale (Cochin)	COSTE (F.)
Clinique stomatologique (Pitié)	DECHAUME (M.)
Clinique thérapeutique chirurgicale (Vaugirard)	SENEQUE (J.)
Clinique thérapeutique médicale (St-Antoine)	LEMAIRE (A.)
Clinique urologique (Cochin)	FEY (B.)
Embryologie	GIROUD (A.)
Histoire de la médecine et de la chirurgie (Lariboisière)	SEZE (S. de)
Histologie	VERNE (J.)

Hygiène et Clinique de la première enfance (Trousseau)	MM. TURPIN (R.)
Hygiène et médecine préventive	JOANNON (P.)
Hygiène et médecine préventive (Prof. à titre pers.)	DEPARIS (M.)
Médecine du Travail	DESOILLE (H.)
Médecine légale	PIEDELIEVRE (R.)
Parasitologie	GALLIARD (H.)
Pathologie chirurgicale	COUVELAIRE (R.)
Pathologie exotique	LAVIER (G.)
Pathologie expérimentale et comparée)	MERKLEN (F.-P.)
Pathologie médicale	MILLIEZ (P.)
Pathologie et thérapeutique générales	GARCIN (R.)
Pharmacologie	CHEYMOL (J.)
" (Prof. à titre personnel)	LEVY (Mlle J.)
Physiologie	BINET (L.)
" (Prof. à titre personnel)	BARGETON (P.)
Physique médicale	DOGNON (A.)
" " (Prof. à titre personnel)	DJOURNO (A.)
Radiologie médicale	DESGREZ (H.)
Technique: chirurgicale et Chirurgie expérimentale	LEGER (L.)
Thérapeutique	BROUET (G.)

II.- PROFESSEURS SANS CHAIRE, PROFESSEURS AGREGES

et MAITRES de CONFERENCES - AGREGES :

Anatomie	MM. CABROL (C.) COUINAUD (C.) OLIVIER (G.)
Anatomie pathologique	Mlle GAUTHIER-VILLARD (P.) Pr. sens ch. MM. BUSSE GOUYGOU (Ch.) ORCEL (L.) PAILLAS (J.) VOURC'H (G.) NEVOT (A.) Pr. s. ch. BARBIER (P.) CHRISTOL (D.) TOURNIER (P.)
Anesthésiologie	
Bactériologie	DESGREZ (P.) (Pr. sens ch.) POLONOSKI (J.) M. con
Biochimie médicale	PLAS (F.) DENOIX (P.) MATHE (G.)
Biologie appliquée à l'Education Physique & aux Sport	
Carcinologie	

Dermato-Syphiligraphie

Electro-Radiologie

Embryologie

Hématologie

Histologie

Hydrologie

Hygiène

Maladies infectieuses

Médecine légale

Médecine du travail

Neurologie

Obstétrique

Ophthalmologie

Orthopédie

Oto-rhino-laryngologie

Parasitologie

Pathologie chirurgicale

MM. DUPERRAT (B.)

LEDOUX-LEBARD (G.)

TUCHMANN-DUPIESSIS (

pr. sans che.

BILSKI-PASQUIER (G.)

DAUSSET (J.)

COUJARD (R.) Pr. s. ch.

MARQUIS (M.)

RACADOT (J.)

CORNET (A.)

BOYER (J.) Pr. s. ch.

Mme CORRE-HURST (L.)

MM. BASTIN (R.)

DUPONT (V.)

DEROBERT (L.)

Pr. s. ch.

HADENGUE (A.)

FOURNIER (E.)

GUENIOT (M.)

ALBAHARY (C.)

LHERMITTE (F.)

GRANJON (A.)

HERVET (E.)

LE LORIER (G.)

MORIN (P.)

MUSSET (R.)

ROBEY (M.)

TROYER-ROZAT (J.)

BREGEAT (P.)

SARAUX (H.)

JUDET (R.)

RAMADIER (J.)

DEBAIN (J.)

BRUMPT (L.C.) P. s. ch.

CH. DAUD (A.)

BARCAT (J.)

BINET (J.P.)

CAUCHOIX (J.)

CHATELIN (C.L.)

DUBOST (Ch.)

DUBOST (Cl.)

FAUREL (J.)

FLABEAU (F.)

GERMAIN (A.)

LAURENCE (G.)

agr. per.

Pathologie chirurgicale (suite)

MM. LORTAT-JACOB (J.L.)
LOYGUE (J.)
MERCADIER
PERROTIN (J.)
ROBERT (H.)
THOMERET (G.)

Pathologie exotique

SCHNEIDER (J.)

Pathologie expérimentale

CROSNIER (J.)
HARTMANN (L.)
LOEPER (J.)
MAURICE (J.)
RICHET (G.)

Pathologie médicale

AUSSANNAIRE (M.)
BOUR (H.)
BOUVIER (J.)
BRICAIRE (H.)
BRISAUD (H.)
BROCARD (H.)
BUGE (A.)
CASTAIGNE (P.) M.Conf.
CATINAT (J.)
CONTAMIN (F.)
COURY (C.)
FREZAL (J.)
HOUSSET (E.)
LAROCHÉ (R.)
LESOBRE (R.)
MACREZ (C.)
NICK (J.)
PEQUIGNOT (H) M.Conf.
ROYER (P.)
WOLFROMM (R.)

Pédiatrie - Puericulture

JOSEPH (R.)
MANDE (R.)
MOZZICONACCI (C.)
ROSSIER (A.)

Pharmacologie

BOISSIER (J.)
LECHAT (P.)

Physiologie

PARROT (J.) Pr.s.Ch.
DEJOURS (P.)

1. The first part of the paper

is devoted to a general

introduction

to the subject

of the paper

and to a brief

review of the

literature on

the subject

of the paper

and to a brief

review of the

literature on

the subject of the paper

and to a brief

review of the

literature on

the subject of the

paper and to a

brief review of

the literature on

the subject of the

paper and to a

brief review of

the literature on

the subject of the

paper and to a

brief review of

the literature on

the subject of the

paper and to a

brief review of

the literature on

the subject of the

paper and to a

brief review of

the literature on

the subject of the

paper and to a

brief review of

the literature on

the subject of the

paper and to a

brief review of

the literature on

the subject of the

the subject of the paper

the subject of the paper

the subject of the paper

the subject of the paper

the subject of the paper

the subject of the paper

the subject of the paper

Physique médicale	MM. GOUGEROT (L.) M. Conf. Pr. sans ch. KELLERSHOHN KREIS (B.) PICHOT (P.) DUCHE (D.) DELBARRE (F.) CERNEA (P.)
Pneumo phtisiologie	
Psychiatrie	
Psychiatrie infantile	
Rhumatologie	
Stomatologie	
Thérapeutique	Mme A. CHAPUT M. Conf. Agr. GRELLET (M.) MM. CHASSAGNE (P.) LAMOTTE (M.) QUENU (L.)
Urologie	

III.- PROFESSEURS SANS CHAIRE ET AGREGES CHARGES DE COURS DE

CLINIQUE ANNEXE

(à titre permanent)

Anatomie	MM. DEBEYRE ABOULKER (P.) AMELINE (A.) Pr. s. ch. HUGUIER (J.) OLIVIER (C.) PADOVANI (P.) POILLEUX (F.) ROUX (M.) VERNE (J. M.)
Clinique Chirurgicale	
Clinique médicale	BOUDIN (G.) CONTE (M.) DOMART (A.) PERRAULT (M.) RAMBERT (P.) THIEFFRY (S.) TURIAF (J.) GRASSET (J.) LEPAGE (F.) MAYER (M.) RAVINA (J.) DESVIGNES (P.) OFFRET (G.) MADURO (R.)
Clinique obstétricale	
Clinique ophtalmologique	
Clinique oto-rhino-laryngologique	

1. The first of these is the fact that the number of cases of disease is increasing. This is due to a number of causes, including the fact that the population is increasing, and the fact that the standard of living is improving. This leads to a greater number of people being exposed to the disease, and to a greater number of people being able to afford the treatment.

2. The second of these is the fact that the disease is becoming more virulent. This is due to a number of causes, including the fact that the disease is being spread by a more virulent strain, and the fact that the disease is being spread by a more virulent strain.

THE DISEASE AND ITS CAUSES

The disease is caused by a number of factors, including the fact that the population is increasing, and the fact that the standard of living is improving. This leads to a greater number of people being exposed to the disease, and to a greater number of people being able to afford the treatment.

3. The third of these is the fact that the disease is becoming more common. This is due to a number of causes, including the fact that the disease is being spread by a more common strain, and the fact that the disease is being spread by a more common strain.

4. The fourth of these is the fact that the disease is becoming more difficult to treat. This is due to a number of causes, including the fact that the disease is being spread by a more difficult to treat strain, and the fact that the disease is being spread by a more difficult to treat strain.

Clinique pédiatrique et puériculture	MM. LAPLANE (R.)
Clinique psychiatrique	BARUK (H.)
Clinique urologique	KUSS (R.)
Médecine légale	GAULTIER

IV.- PROFESSEURS DETACHES DANS LES UNIVERSITES

ETRANGERES

Bactériologie	MM. HAUDUROY (P.)
	Pr. s. ch.
Biochimie médicale	ETTORI (J.)
	Pr. à t. pers.
Pathologie chirurgicale	RUDLER (J.)
	Pr. s. ch.
Secrétaire Général de la Faculté	MM. LENA (J.)
Secrétaires	Mme BEURLAND (H.), Melle CHAINTREUIL (G.) Melle HURE ()
Conservateur en Chef	Monsieur le Docteur HAHN (A.)
Conservateurs	Melles DUMAITRE (P.), GOICHON (A.M.)
Bibliothécaires	Mmes CONTET (J.), FORGET (F.)
	Melles LAURENT (H.), LE NOIR (G.), QUIEVREUX (E.)

Par délibération en date du 9 Décembre 1798, l'Ecole a arrêté que les opinions émises dans les dissertations qui lui seront présentées doivent être considérées comme propres à leurs auteurs et qu'elle n'entend leur donner aucune approbation ni improbation.

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

A la mémoire de mon Père,

Professeur Docteur à l'Université de VARSOVIE

Qui consacra sa vie
à la recherche médicale

A Monsieur le Professeur FAUVERT,

Professeur de Biologie Médicale à la Faculté
de Médecine de PARIS,

Qui nous a fait l'honneur de présider
cette thèse.

A Monsieur le Professeur A. J O S T

de la Faculté des Sciences de PARIS,

dont l'enseignement m'initia aux techniques
de l'expérimentation endocrinienne

A Monsieur ALBEAUX FERNET,
Médecin des Hôpitaux de PARIS,

Qui a bien voulu nous accueillir au laboratoire
de son service,

où ce travail fut accompli.

A Monsieur le Docteur H.P. K L O T Z,

Médecin des Hôpitaux de PARIS,

Qui a bien voulu nous confier des melades
et nous aider de ses conseils .

A Monsieur J.D. ROMANI,

Directeur du Laboratoire d'Endocrinologie,

Qui inspire cette thèse et l'enrichit de ses travaux.

A Madame A. K E L L E R ,

à laquelle est due la partie
histologique de ce travail ,

A Mademoiselle C. B E S S A R D ,

Qui en assure la partie
biochimique.

A Messieurs les Docteurs :

AUDOLY ,
AUGIER,
COSSA,
GAZEIX,
GUIRAN,
LAPEYRE,
MAZET,
RIVOIRE,
RIVOLIER,

Médecins des Hôpitaux de NICE

•

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

I N T R O D U C T I O N

La régulation du métabolisme du sel est un problème vaste et complexe. L'aldostérone n'en est qu'un des aspects.

Le rein, en particulier, est non seulement un effecteur, mais possède aussi une importante autonomie d'adaptation. Nos connaissances en ce domaine, d'ailleurs en pleine évolution, n'ont pu être résumées dans ce travail.

L'hormone antidiurétique partage avec l'aldostérone, comme nous le verrons, un système de contrôle en retour, chacune déterminant un facteur essentiel à la régulation de l'autre.

Nous ne traiterons que la partie "aldostérone" de ce dyptique. De même, nous ne traiterons pas les découvertes récentes et fécondes du domaine des "antialdostérone".

Enfin, l'isolement de l'aldostérone, sa synthèse, les moyens de dosage, sa biogenèse et son catabolisme - tous sujets qui ont donné lieu à des mises au point récentes - seront volontairement passés sous silence.

Ainsi, nous avons été amenés à limiter sévèrement notre sujet.

PLAN GÉNÉRAL

INTRODUCTION

PREMIERE PARTIE

VOLEMIE et VOLUMECEPTEURS

1.- VOLEMIE

- a.- Généralités
- b.- Etude de l'hypervolémie isolée
- c.- Etude de l'hypovolémie isolée

2.- VOLUMECEPTEURS

- a.- Historique
- b.- Récepteurs de l'oreillette droite
- c.- Récepteurs de la jonction thyrocarotidienne
- d.- Schéma d'ensemble

3.- ILLUSTRATION CLINIQUE - ALDOSTERONURIE SOUS L'EFFET DES DIURETIQUES

- a.- Méthodes
- b.- Sujets sans oedèmes
- c.- Sujets oedemateux
- d.- Discussion

4.- CONCLUSION

5.- BIBLIOGRAPHIE

SECONDE PARTIE

CENTRES REGULATEURS CEPHALIQUES

I.- RÔLE de l'HYPOPHYSE

- a.- Effets de l'hypophysectomie
- b.- Action de l'A.C.T.H. in vivo
 in vitro
- c.- Observations cliniques

II.- CENTRES DIENCEPHALO-MESENCEPHALIQUES

- a.- Leur mise en évidence
- b.- Historique en (pathologie traumatique et
 (neuro-chirurgicale
 (pathologie médicale
- c.- Observations cliniques
- d.- Calcul statistique et Discussion

III.- RESUME

IV.- BIBLIOGRAPHIE

TROISIEME PARTIE

HORMONES ADRENO-GLOMERULO-TROPHIQUES

I.- HISTORIQUE

- a.- Mise en évidence dans l'urine et dans le plasma
- b.- Extraits du mésencéphale et de l'épiphyse

II.- EXPERIMENTATION d'un EXTRAIT EPIPHYSAIRE GLOBAL

- a.- Histologie et Histochimie de la glomérulée (rats)
- b.- Rétention sodique (rats)

3.- FRACTIONNEMENT DE CET EXTRAIT

- a.- Formule provisoire d'un des composants
- b.- Son expérimentation

4.- DISCUSSION

5.- BIBLIOGRAPHIE

CONCLUSIONS

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^n \left(\frac{1}{2} \right)^n = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} \right)^{2n} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{4} \right)^n = \frac{1}{4^{n+1}}$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^n \left(\frac{1}{2} \right)^n = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} \right)^{2n} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{4} \right)^n = \frac{1}{4^{n+1}}$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^n \left(\frac{1}{2} \right)^n = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} \right)^{2n} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{4} \right)^n = \frac{1}{4^{n+1}}$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^n \left(\frac{1}{2} \right)^n = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} \right)^{2n} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{4} \right)^n = \frac{1}{4^{n+1}}$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^n \left(\frac{1}{2} \right)^n = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} \right)^{2n} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{4} \right)^n = \frac{1}{4^{n+1}}$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^n \left(\frac{1}{2} \right)^n = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} \right)^{2n} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{4} \right)^n = \frac{1}{4^{n+1}}$$

PREMIERE PARTIE

VOLEMIE ET VOLUMECEPTEURS

1.- VOLEMIE

- a.- Généralités
- b.- Etude de l'hypervolémie isolée
- c.- Etude de l'hypovolémie isolée

2.- VOLUMECEPTEURS

- a.- Historique
- b.- Récepteurs de l'oreillette droite,
- c.- Récepteurs de la jonction thyrocarotidienne
- d.- Schéma d'ensemble

3.- ILLUSTRATION CLINIQUE - ALDOSTERONURIE SANS-DIURETIQUES

- a.- Méthodes
- b.- Sujets sans oedèmes
- c.- Sujets oedemateux
- d.- Discussion

4.- CONCLUSION

5.- BIBLIOGRAPHIE

I. - V O L E M I E

. - GÉNÉRALITÉS

L'étude des récepteurs contrôlant "en retour" l'excrétion sodique était rendue difficile par leur intégration dans la régulation complexe du métabolisme hydrominéral.

En effet, les changements hémodynamiques agissent directement sur les reins, provoquant des variations du flux rénal, et par ce moyen, celles de la filtration glomérulaire et vraisemblablement aussi de la réabsorption tubulaire.

Ces interactions et celles qui existent avec le système antidiurétique rendaient impossible une interprétation sélective lorsqu'on n'avait à sa disposition que des résultats finaux, c'est-à-dire le taux de la diurèse et la concentration sodique urinaire.

Néanmoins, la relative indépendance de l'excrétion sodique au cours de changements de la diurèse fut démontrée précocément.

Par exemple, dès 1954, BRUN & Collaborateurs (10) notent qu'au cours de l'oligurie orthostatique, l'hyponatrémie était cinétiquement et quantitativement indépendante de la réduction du flux rénal et de la diurèse.

. - ETUDE DE L'HYPÉRVOLÉMIE ISOLÉE

En 1951, WELT et ORLOFF (57) écrivent que l'augmentation du volume plasmatique entraîne chez le sujet normal une excrétion accrue des électrolytes.

En 1952, STRAUSS, DAVIS, RASEMBAUM et ROSSMEISL (50) ont obtenu une importante décharge sodique par des perfusions hypotoniques isolées.

La même année, JUDSON, HATCHER, HALLPERIN, WILLKINS (31) en étudiant la congestion veineuse des membres inférieurs découvrent qu'on peut empêcher la survenue de la rétention sodique par des transfusions abondantes, travaux repris et confirmés par les mêmes auteurs (32).

GOODYER, PETERSON et RELMAN (22), dès 1949, PETERSDORF et WELT, en 1953, avaient mis en évidence une fuite sodique au cours de perfusions d'albumine hyperoncotiques. (43)

LEAF, BARTTER, SANTOS et WRONG (33), ainsi que WESTON, HANENSON, GROSSMAN, BERDASCO et WOLFMAN (54) réalisèrent une étude systématique de l'hypervolémie provoquée par la pitrésine. Le sujet d'expérience soumis à la fois à une surcharge aqueuse et à l'hormone antidiurétique présente successivement :

- 1.- Une fuite sodique (accompagnée d'une diurèse osmotique)
- 2.- 24 à 48 heures après l'arrêt de l'hormone antidiurétique une abondante diurèse aqueuse qui, à cause du déficit sodique de la première période, abaisse la volémie et le poids au-dessous des chiffres initiaux.
- 3.- L'hypovolémie ainsi réalisée précède une rétention sodique compensatrice.

Donc, lorsque la volémie est augmentée, et ceci même par un moyen qui n'influence ni la natrémie ni le capital sodique, il existe une décharge sodique.

C.- ETUDE DE L'HYPVOLÉMIE ISOLÉE

Le corollaire logique, à savoir que l'hypovolémie provoque une rétention sodique, reçut, lui aussi, une abondante vérification expérimentale.

En 1953, FUTZGUGH et collaborateurs (16) ont réalisé une rétention sodique en soustrayant le sang des membres inférieurs par garrot. D'autres auteurs, déjà cités, ont fait des observations semblables en étudiant les congestions veineuses des membres inférieurs. Plus récemment, MULLER, BLONDEL et MANNING (39) GOWENLOCK MILLS et THOMAS (24) ont repris l'étude de l'orthostatisme et ont

montré que la baisse de la natrurie était due à une réaction hyperaldostéronique, le mécanisme invoqué étant une diminution du retour veineux.

BARTERR (4) et d'autres auteurs ont provoqué l'hyperaldostéronémie au cours de saignées. Le clocher est annulé en retrayant le sang soustrait. (15)

FINE, MEISELAS et AUERBACH (17) CAMP, TATE, LAWRENCE et WOOD (11), de nombreux autres auteurs ont aussi obtenu des résultats de même signification.

Donc, indépendamment de la natrémie, une hypovolémie expérimentale isolée entraîne une rétention sodique.

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..

II.- VOLORÉCEPTEURS

A.- HISTORIQUE

Nous avons vu que les accumulations sanguines dans les membres inférieurs équivalaient à une hypovolémie (garrot, orthostatisme, congestions veineuses), ce qui suggérerait qu'il ne s'y trouvait pas de volorécepteurs.

Voici quelques expériences qui orientèrent vers une localisation thoracique. DRURY, HENRY et GOODMAN (13), en 1947, trouvent une diminution de la diurèse chez les animaux qu'on fait respirer en pression positive.

SIEKER, GAUER et HENRY, en 1954, ont repris ces travaux chez l'homme et l'étendirent aux pressions négatives (qui provoquent une augmentation de diurèse et d'excrétion sodique). (48)

En 1956, HENRY, GAUER et LEEVES (27) réalisent des variations d'excrétion sodique en introduisant un ballonnet gonflable dans l'oreillette droite (28).

DAVIS et collaborateurs, au cours de leurs travaux sur les conséquences de la striction de la veine cave inférieure (technique utilisée dès 1948 par Mac KEE, SCHLOERB, SCHILLING, TISCHKOPF et WHIPLE) ont mis en évidence le fait que la rétention sodique est le fait premier du syndrome, puis démontrèrent qu'elle est due elle-même à un hyperaldostéronisme. (12 - 37)

D'autres publications attireront l'attention sur la région cervicale.

VIAR, OLIVER, EISENBERG, LOMBARDO et WILLIS, en 1951, découvrent que la diminution de la natrurie provoquée par l'orthostatisme est annulée par la compression du cou. (53)

En 1953, GREEN localise à la zone carotidienne les récepteurs sensibles chez le chat. (25)

Mais nos connaissances actuelles sont surtout dues à BARTTER qui, dans une série de publications, de 1947 à 1960, reprit avec ses collaborateurs l'étude du problème. (3, 4, 5, 6, 7, 19, 20)

B. - RÉCÉPTEURS DE L'OREILLETTE DROITE

La constriction susdiaphragmatique de la veine cave inférieure provoque une augmentation de l'aldostérone (6) dans le sang prélevé à la veine surrénalienne par la technique décrite en 1955 par HUME et NELSON (29). Cette réaction est bien due à la diminution volumétrique du retour veineux, car elle peut être annulée par une perfusion sus strictionnelle. (DAVIS a obtenu des résultats différents (12), que BARTTER (5) attribue à une vitesse insuffisante de la perfusion). Ce phénomène peut être reproduit plusieurs fois chez le même chien et les vitesses des réactions (l'ordre de grandeur est d'une heure) sont compatibles avec un mécanisme hormonal.

La section bilatérale des vaques n'empêche pas la montée pendant la striction, mais prévient la chute consécutive au relâchement. PEARCE (42), en 1959, et d'autres auteurs ont confirmé ces résultats.

Il est à remarquer que la vagotomie seule ne provoque pas de changements significatifs de l'aldostéronémie.

C. - RÉCÉPTEURS DE LA JONCTION THYRO-CAROTIDIENNE

La compression bilatérale des carotides communes provoque, outre l'hypertension artérielle, (fait connu depuis longtemps) une augmentation de la sécrétion de l'aldostérone.

La dénervation des carotides annule les deux réactions, mais il est possible de les dissocier, car :

- la dénervation des sinus carotidiens supprime l'effet hypertensif et laisse persister l'effet hyperaldostéronémique,
- alors que la dénervation des jonctions thyro-carotidiennes ne supprime que l'hyperaldostéronisme.


Cette technique a été utilisée pour l'étude du syndrome de la compression de la veine cave inférieure, qui, rappelons-le,

comprend une rétention hydrominérale (avec hyperaldostéronémie), une ascite et, dans le deuxième temps, des oedèmes. L'opération chez le chien porteur de la maladie expérimentale en pleine évolution a amené une décharge sodique, une diminution de l'ascite et une chute pondérale.


D'autres animaux furent soumis à un bilan sodique précis et il a été confirmé qu'après une dénervation thyro-carotidienne, leur capacité à fixer le sodium était très diminuée.

Les animaux porteurs d'une striction V.C.I. et soumis à un régime constant de 60 meq par jour présentent un bilan très largement positif. Or, après l'opération, ce dernier se négative et ceci, même si une paracentèse est pratiquée. (Remarquons avec BARTTER qu'un régime très hypersodé à 200 meq provoque une fixation sodique et une rechute clinique, mais par un mécanisme indépendant de l'aldostérone, puisqu'il subsiste après surrénalectomie bilatérale).


En étudiant, au cours des expériences citées, les pressions périphériques et intravasculaires (oreillette droite et carotide), BARTTER conclut que le système veineux est sensible à des augmentations volémiques et a surtout un rôle d'inhibition par opposition au système artériel (Il s'agit là surtout d'une hypothèse de travail) qui est sensible aux diminutions volémiques tensionnelles et dont le rôle est d'augmenter la sécrétion.



NORMAL



CONSTRICITION
DE LA VEINE CAVE
OU DE LA CAROTIDE



RELACHEMENT

(Schema emprunté à Bartter et Gonn
(légèrement modifié)

Les résultats que nous venons d'évoquer ouvrent des perspectives extraordinaires en pathologie humaine. Nous ne citerons que les travaux de cardiologie commentée par BARTTER lui-même, EICHNA et collaborateurs qui, en 1953, décrivent, à l'appui de ces conceptions, que, chez les cardiaques décompensés à basse pression systolique, l'augmentation de celle-ci est le fait premier, cause à son tour de la perte sodique recherchée. L'étude de lésions cardiaques du béri-béri, faite par WEISS et VILKING, et reprise par BLACKETT, a montré que, même chez ces malades à haute pression systolique initiale, une augmentation de celle-ci précédait obligatoirement la fonte des oedèmes. (5, 8, 14, 58)

III.- ILLUSTRATION CLINIQUE

ALDOSTERONURIE SOUS-DIURETIQUES

A.- MÉTHODES

L'administration de diurétiques est, en clinique humaine, le moyen le plus simple de réaliser l'hypovolémie.

Nous avons utilisé :

- l'acétazolamide 850 mg/jour
- l'hydrochlorothiazide 50 à 150 mg/jour
- 1,1 dioxyde de la dichlorométhyl
- 1-6, chloro 7_p sulfamyl 1,24 benzo-
- thiazidine 10 mg/jour
- l'hydroflumethiazide 100 à 200 mg/jour


Le petit nombre des cas nous a interdit une étude comparative de ces diurétiques; elle sera donnée dans un travail ultérieur.

La ration des sujets en sodium et potassium a été calculée approximativement (Table de constitution des aliments).

La ration hydrique était comprise entre 1.000 et 1.250 cc par jour pour les sujets sans oedèmes; entre 700 et 750 cc. pour les sujets oedémateux.

Le sodium et le potassium ont été dosés par photométrie de flamme.

Le chlore urinaire a été dosé par la méthode de O.SCHALES et S.S.SCHALES.



L'aldostérone urinaire a été dosée après hydrolyse des urines à pH 1,5 pendant 24 heures à la température ambiante; extraction par le chloroforme, chromatographie préparative sur colonne de florisil et double chromatographie sur papier (1) dans le système toluène/propylèneglycol et (2) dans le système NO 1 de M.M.PECHET (toluène/ éther de pétrole/ butanol/éthanol/eau); l'aldostérone a été évaluée, après élution par la réaction au bleu de tetrazolium alcalin (J.D.ROMANI, 42)

DIX SUJETS SANS OEDÈMES

Notre étude porte sur quatre sujets normaux (cas 2, 3, 9, 10) volontaires, cinq sujets obèses (cas 1, 5, 6, 7, 8) et un sujet hypertendu (cas 4).

Les chiffres de base (Voir tableau 1) ont été normaux chez neuf sujets sur dix.

L'excrétion de l'aldostérone passe de 7 gamma de moyenne à 23 gamma 7 après un jour de diurétique, monte à 26 gamma 1 après deux jours et redescend lentement.

Ce phénomène est constant mais les variations individuelles sont très importantes (par exemple, le sujet 2 passe de 4,6 à 108,8 - ce qui d'ailleurs s'est accompagné d'un malaise très important - alors que d'autres sujets n'ont fait que doubler leur aldostéronurie)

La persistance de l'aldostéronurie a été, elle aussi, très variable. Dans quatre cas (sur les huit où ce fait a pu être étudié), l'hyperaldostéronurie a persisté pendant un temps plus ou moins long. Dans les cas 3 et 9, son taux a continué même à monter après l'arrêt du diurétique.

L'excrétion du sodium et surtout le taux sodium ont évolué inversement à l'excrétion d'aldostérone, potassium

(Voir tableau 2)

TABLEAU N°1 - Etude de l'excrétion urinaire de l'aldostérone
sous l'action des diurétiques

DIURETIQUE

	<u>Base</u>	<u>Jour 1</u>	<u>Jour 2</u>	<u>Arrêt</u>
1 Obèse	9,7	19,7	.	20,6
2 Normal	4,6	108,8	.	4,1
3 Normal	8,7	7,5	9,2	19,0
4 H.T.A.	3,0	11,0	17,5	9,7
5 Obèse	3,5	5,5	.	9,0
6 Obèse	6,0	12,7	.	11,5
7 Obèse	10,5	21,5	51,5	16,0
8 Obèse	6,0	11,8	.	.
9 Normal	15,0	.	.	92,0
10 Normal	4,5	15,0	.	.
<u>Moyennes :</u>	<u>7,1</u>	<u>23,7</u>	<u>26,1</u>	<u>22,7</u>

Le diurétique a été administré soit un seul jour, soit deux jours consécutifs. Les dosages de l'aldostérone urinaire ont été réalisés dans les conditions basales la veille de l'administration de la drogue, sous l'influence de celle-ci et immédiatement après suspension de son action.




TABLEAU N° 2 - Corrélations entre le taux d'excrétion urinaire de l'aldostérone, l'excrétion du sodium et du potassium et le rapport sodium/potassium dans les urines, immédiatement après la suspension d'un diurétique administré pendant un ou deux jours.


U R I N E S

<u>Aldostérone</u> <u>mcg/24 h.</u>	<u>Sodium</u> <u>mEq/24 h.</u>	<u>Potassium</u> <u>mEq/24 h.</u>	<u>Na/K</u>
20.6	46.0	78.0	0,58
4.1	77.0	48.0	1.60
19.0	42.0	48.0	0.87
9.7	19.4	36.5	0.55
9.0	34.4	53.0	0.64
11.5	35.0	27.0	1.30
16.0	3.4	51.0	<0.1
92.0	28.0	42.0	0.59

TABIEAU N° 3 Etude de la diurèse hydrique, sodique, potassique et de l'excrétion urinaire de l'aldostérone chez 15 sujets traités par des diurétiques sulfamidés dérivés de la chlorothiazide. 1.- Sujets normalement hydratés (Normaux, HTA, Obèses)

N°	TRAITEMENT	Aldostéronurie mcg/24 h.	Natrurie mEq/j.	Kaliurie mEq/j.	Diurèse l.
1.-	Base	9.7	80.0	56.0	0.750
	HCT 150 mg	19.7	272.0	104.0	1.800
	Arrêt	20.6	46.0	78.0	1.325
2.-	Base	4.6	128.0	28.0	0.870
	SU.7057 10	108.8	303.0	90.0	2.250
	Arrêt	4.1	77.1	48.0	1.500
3.-	Base	8.7	23.3	37.5	0.750
	HCT 100	7.5	225.0	34.0	2.250
	HCT 100	9.2	97.0	57.0	0.975
	Arrêt	19.0	42.0	48.0	0.850
4.-	Base	3.0	67.3	54.6	0.970
	HFT 100	11.0	283.5	75.6	2.700
	HFT 100	17.5	117.6	73.5	1.470
	Arrêt	9.7	19.4	36.5	0.590
5.-	Base	3.5	145.2	70.4	0.880
	HFT 200	5.5	240.0	84.0	2.000
	Arrêt	9.0	34.4	53.0	0.530
6.-	Base	6.0	176.0	47.0	0.750
	HCT 50	12.7	252.0	54.0	1.680
	Arrêt	11.5	35.0	27.0	0.410
7.-	Base	10.5	34.0	57.0	1.360
	CT 750	21.5	45.0	150.0	2.080
	CT + M°	51.5	146.0	126.0	2.250
	Arrêt	16.0	3.4	51.0	0.690
8.-	Base	6.0	99.7	11.3	0.710
	HCT 50	11.8	280.0	29.0	2.070
9.-	Base	15.0	126.0	37.0	1.550
	HCT 50	-	-	-	-
	Arrêt	92.0	25.0	42.0	1.400
10.-	Base	4.5	58.0	68.0	0.580
	HCT 50	15.0	311.0	50.0	1.830

Note Obs.7 - Le second jour, la chlorothiazide a été associée à 1 ampoule de Merelluride (Myo-Percapyl)



C.- CINQ SUJETS OÉDÉMATEUX

C A S 11

Malade de 54 ans, atteint d'insuffisance cardiaque largement décompensée, Gros oedèmes périphériques.

Sous l'effet du dihydrochlorothiazide, a eu lieu une fonte spectaculaire des oedèmes. Pas de réaction hyperaldostéronurique.

C A S 12

Malade de 60 ans. Cœur pulmonaire chronique avec dyspnée et oedèmes.

Il eut une forte augmentation de la diurèse, avec amélioration clinique des oedèmes, là encore concomitante à une aldostéronurie en plateau.

C A S 13

Malade de 55 ans, asystolique. Une montée hyperaldostéronurique très irrégulière, une natrurie le reflétant mal - une amélioration clinique médiocre.

C A S 14

Malade de 60 ans, atteint d'une cirrhose éthylique et d'une insuffisance cardiaque. L'aldostéronémie de base fut élevée, la diurèse basse. A signaler une aldostéronurie basse, le lendemain du seul jour où les diurèses aqueuse et sodique furent satisfaisantes.

C A S 15


Malade de 60 ans; cirrhose éthylique avec gros oedèmes. Une hyperaldostéronurie de base, maintenue sous diurétiques. Il est à signaler qu'après un plateau d'une semaine, adjonction d'une 17 spiro lactone s'accompagne d'une natrurie massive.

TABEAU N° 4

Etude de la diurèse hydrique, sodique, potassique et de l'excrétion urinaire de l'aldostérone chez 15 sujets traités par les diurétiques sulfamidés dérivés de la chlorothiazide. 2.- Sujets porteurs d'œdèmes (Insuffisance cardiaque et cirrhose)

N°	TRAITEMENT	Aldostéronurie mcg/24 h.	Natrurie mEq/j.	Kaliurie mEq/j	Diurèse l.
11.-	Base	21.0	14.0	37.5	1.520
	HCT 100	-	248.5	75.6	2.300
	HCT 100	-	306.0	60.0	3.000
	HCT 100	-	98.2	50.6	2.360
	HCT 100	-	197.5	55.0	2.500
	HCT 100	25.5	53.7	68.3	1.120
12.4	Base	8.5	17.0	17.5	0.345
	HCT 100	-	49.3	65.7	1.375
	HCT 100	10.5	51.7	38.0	0.925
13.-	Base	3.4	1.5	33.0	0.750
	HCT 100	6.8	31.5	45.0	0.900
	HCT 100	-	55.0	36.0	1.000
	HCT 100	17.5	90.0	38.0	1.000
	HCT 100	6.5	73.0	40.0	1.140
	Arrêt	3.3	54.0	41.0	0.900
14.-	Base	17.2	13.2	23.3	0.440
	SU 7057 10	-	65.0	45.5	1.315
	SU 7057 10	3.3	31.6	31.6	0.575
	SU 7057 10	-	11.4	45.6	0.570
	SU 7057 10 (7° jour)	9.4	8.2	32.1	0.410
	Arrêt	13.7	4.7	47.0	0.470
15.-	Base	23.5	7.5	30.6	0.420
	HCT 100	23.0	55.0	81.7	0.985
	HCT 100 + 600 SC.9420				
	(9° jour)	18.6	95.0	34.6	0.790

Note - Dans les tableaux 3 et 4, les diurétiques sont désignés par les indicatifs suivants, suivis de la dose en milligrammes : CT = chlorothiazide; HCT = hydrochlorothiazide; HFT = hydrofluméthiazide; SU 7057 est un dérivé de la chlorothiazide (1.1. dioxyde de la dichlorométhyl 1-6, chloro è. sulfamyl - 1.2.4. benzothiazidine). Le SC.9420 est une stéroïde 17, spiro lactone (aldactone).



D.- DISCUSSION

Chez un sujet non oedemateux, qu'il s'agisse d'un volontaire bien portant, d'un obèse ou d'un hypertendu, l'action d'un diurétique est vivement stoppée par une adaptation de la sécrétion d'aldostérone dès que s'ébauche une tendance à l'hypovolémie.

Par contre, chez un sujet porteur d'oedèmes, ces derniers forment un volant compensateur, pouvant alimenter la volémie, et autorisant par là même la diurèse sodique recherchée.

Lorsque, chez un oedemateux, il existe une résistance primaire aux diurétiques, elle est due, sous réserve du petit nombre de cas étudiés, à une hyperaldostéronémie basale ou réactionnelle.

Nous ne pouvons pas encore en expliquer le mécanisme, mais cette notion comporte, de toute façon, une sanction thérapeutique, à savoir l'usage des "antialdostérone".

R E S U M É

Entre l'aldostérone, l'hormone de la rétention sodique et le sel, ingéré ou circulant, l'eau intravasculaire constitue un chaînon obligatoire.

La natrémie n'a pas d'action régulatrice directe, mais son augmentation, par le jeu à la fois de l'appel d'eau extra-vasculaire, et la rétention d'eau due à l'hormone antidiurétique (activée par des osmorécepteurs) produit une augmentation de la volémie.

Celle-ci agit sur les volorécepteurs situés dans l'oreillette droite, qui transmettent l'information au moyen de nerfs pneumogastriques, suscitant une diminution de la sécrétion de l'aldostérone.

L'hyponatrémie entraîne, par les mêmes mécanismes, une diminution de la volémie. Les récepteurs sensibles à cette dernière se trouvent à la jonction thyrocarotidienne, la transmission, là aussi, est nerveuse et il en résulte une augmentation de l'aldostérono-sécrétion.

Par ailleurs, les perspectives étio-pathogéniques ainsi ouvertes méritent d'être étudiées au cours de toutes les rétentions sodiques, si nombreuses en clinique, en reprenant les rapports entre d'une part l'aldostérone; de l'autre, les pressions artérielles et veineuses, les pressions intra-cardiaques, la volémie.

L'aldostéronurie pendant l'hypovolémie induite par les diurétiques constitue la première étape de ce travail.

V.- B I B L I O G R A P H I E

- 4.- ANDERSON C.H., MAC CALLY M. et FARRELL G.L.

The effect of atrial stretch on aldosterone secretion
ENDOCRINOLOGY 64, 202 1959

- 2.- BARGER A.C., MULDOWNNEY F.P. et LIEBOWITZ M.R.

Role of the kidney in pathogenesis of congestive heart failure
Circulation 20 : 273, 1959

- 5.- BARTTER F.C.

Role of aldosterone in regulation of body fluid volume and composition.
Scandinav. J. Clin. & Lab. Invest. 10 : Supp.31.50.1958

- 4.- BARTTER F.C., BIGLIERI E.G., PRONOVE P. et DELEA C.S.

Effects of changes in an intravascular volume on aldosterone secretion in man
Inter. symp. aldosterone . GENEVE, CHURCHILL Edit. 1957

- 5.- BARTTER F.C. et GANN S.


On the hemodynamic regulation of the secretion of aldosterone
Circulation 21 : 1016, 1960.

- 6.- BARTTER F.C., LIDDLE G.W., DUNCAN LE BARBER J.K. & DELEA C.

The regulation of aldosterone secretion in man; the role of fluid volume
J. Clin. Invest. 35 1306 1956

- 7.- BARTTER F.C., MILLS I.H. et GANN D.S.

Increase of aldosterone secretion by carotid artery constriction and its prevention by thyrocervical junction denervation.
J. Clin. Invest. 38 : 986, 1959.



- 8.- BLACKET R.B. Oedema in heart failure lesions from the beri beri heart
Australasian Ann. Med. 4 : 261, 1955
- 9.- BROWN E., HOPPER H. WENNESLAND K
Blood volume and its regulation
Ann. Rev. Physiol. 19 231 1957
- 10.- BRUN C., KNUDSEN E.O. et RAASCHOU F.
The influence of the posture on the kidney function.
Acta Med. Scand. 315, 122, 1945
- 11.- CAMP J.L., TATE F. LEWRANCE P.B. et WOOD J.E.
Effect of posture on salt and water retention
J. Lab. Clin. Med. 52 193, 1958
- 12.- DAVIS J.O., KLIMAN B., YANKOPOULOS N.A. and PETERSON R.E.
Increased aldosterone secretion following acute constriction of the inferior vena cava
J. Clin. Invest. 37 : 1783, 1958.
- 13.- DRURY D.R., HENRY J.P. and GOODMAN
Effects of continuous pressure breathing on kidney function
J. Clin. Invest. 26 : 945, 1947
- 14.- EICHNA L.W., FARBER S.J., BERGER A.R., EARLE D.P., RADER B., PELLEGRINO E., ALBERT R.E., ALEXANDER J.D., TAUBE H. and YOUNGWIRTH S.
Cardiovascular dynamics, blood volumes, renal functions and electrolyte excretion in the same patients during congestive heart failure and after recovery of cardiac compensation.
Circulation 7 : 674, 1953
- 15.- FARRELL G.L., ROSNAGLE R.S. & RAUSCKOLB E.W.
Increased aldosterone secretion in response to blood loss
Circulation 4 606, 1956

- 16.- FITZHUGH F.W. mc WORTHER R.L., ESTES E.H., WARREN J.V. & MERRILL A.J.

The effect of application of tourniquets to the legs on cardiac output and renal function in normal human subjects
J. Clin. Invest. 32 1163

- 17.- FINE D. MEISELAS L.E. & AURERBACH T.

The effect of acute hypovolemia on the release of aldosterone and of the renal excretion of sodium

J. Clin. Invest. 37 232 1958

- 18.- FISHMAN R.A.

Failure of intracranial pressure volume change to influence renal function

J. Clin. Inves. 32 : 847 1953

- 19.- GANN D.S., MILLS I.H. and BARTTER F.C.

On the hemodynamic parameter mediating increase in aldosterone secretion

Fed. Proc. 19 - 122 - 1960

- 20.- GANN D.S., MILLS I.H., BARTTER F.C.

Buffer function of the nerved abiding at the thyrocarotid arterial junction in the dog

Am. J. Physiol. 197, 1229, 1955.

- 21.- GOMORI P. GLAZ E. SUHANESZKY A. et CASAPO G.

Aldosterone and hydrocortisone secretion in dehydration

Lancet 30 259 1960.

- 22.- GOODYER A.V., PETERSON E.R. and RELMAN A.S.

Some effects of albumin infusions on renal function and electrolyte excretion in normal men.

J. Appl. Physiol. 1 : 671 1949

- 23.- GOODKIND M.J., BALL W.C. Jun. & DAVES J.O.

Effect of chronic hemorrhage on urinary aldosterone like activity and sodium and sodium excretion in dogs.

Amer.J. Physiol. 189 181 1957

1931. 1. 1.

1931. 1. 1.

1931. 1. 1.

1931. 1. 1.

1931. 1. 1.

1931. 1. 1.

1931. 1. 1.

1931. 1. 1.

1931. 1. 1.

1931. 1. 1.

1931. 1. 1.

1931. 1. 1.

1931. 1. 1.

1931. 1. 1.

1931. 1. 1.

1931. 1. 1.

1931. 1. 1.

1931. 1. 1.

1931. 1. 1.

1931. 1. 1.

1931. 1. 1.

1931. 1. 1.

1931. 1. 1.

1931. 1. 1.

1931. 1. 1.

1931. 1. 1.

1931. 1. 1.

1931. 1. 1.

1931. 1. 1.

24.- GOWENLOCK A.H., MILLS I.N. et THOMAS S.

Acute postural changes in aldosterone and electrolytes excretion in man.

J. Physiol. (LONDON) 146 133 1959

25.- GREEN J.H.

A new baroreceptor area in the cat

J. Physiol. 1953 122 70

26.- GROSSMAN J.

Volume factors in body fluid regulation

A.M.A. Arch. Inter. Med. 99 93 1957

27.- HENRY J.P., GAUER O.H. et REEVES J.L.

Evidence of the atrial location receptors influencing urine flow

Circulation Research 4 85 1956

28.- HENRY J.P., GAUER O.H., REEVES J.L. et PEARCE J.W.

Possible role of cardiac atrial stretch of receptors in induction of changes in urine flow

J. Physiol. 131 572 1956

29.- HUME D.M. et NELSON D.H.

Adrenal cortical in surgical shock

Surg. Forum 5 568 1955

30.- HOWELL D.S., DAVIS J.O. et LAQUEUR G.L.

Effect of hypophysectomy on electrolyte excretion in dogs with ascites produced by thoracic inferior vena cava constriction

Circulation Res. 3 264 1955

31.- JUDSON W.E., HATCHER J.D., HALPERIN M.H. et WILKINS R.W.

Further studies on the antidiuresis and decrease in sodium excretion during venous congestion of the limbs : Its prevention in normal subjects by a large transfusion : its absence or presence in cardiac patients with or without congestive failure.

J. Clin. Invest. 31/6, 642 1952

32.- JUDSON W.E., HOLLANDER W., HATCHER J.D., HALPERIN M.H. et

FRIEDMAN I.H.

The cardiohemodynamic effects of venous congestion of the legs or of phlebotomy without congestive heart failure

J. Clin. Invest. 34/4 614-621 1955

33.- LEAF A. et MONBY A.R.

An antidiuretic mechanism not regulated by extra cellular fluid tenicity

J. Clin. Invest. 31 60-71 1952

34.- LEAF A., BARTTER F.C., SANTOS R.F. et WRONG O.

Evidence, in man, that urinary electrolytes loss induced by pitressin is a function of water retention

J. Clin. Invest. 32/9, 868 1953

35.- LEWIS J.M., BRUIE R.M., SEVIER S.M. et HARRISON T.R.

The effect of posture and of congestion on the head on sodium excretion in normal subjects

Circulation 2,822 1950

36.- LOVE A.H., RODDIE R.A., ROSENSWEIG J. et SHANKS R.G.

Effect of pressure changes in respired air on renal excretion of water and electrolytes

Clin. Sc. 16 281 1957

37.- Mac KEE F.W., SCHLOERB P.R., SCHILLING J.A., TISHKOFF G.H. et WHIPPLE G.H.

Protein metabolism and exchange as influenced by constriction of the vena cava

J. Exper. Med. 87 457 1948

38.- MILLS I.H., CASPER A.G.T. et BARTTER F.C.

On the role of the vagus in control of aldosterone secretion

Science 128 1140 1958

39.- MULLER A.F., MANNING E.L. et RIONDEL A.M.

Influence of position and activity on the secretion of aldosterone

Lancet 1 I 711 1958

40.- NETRAVISESH V.

Effects of posture and of neck compression on outputs of water, sodium and creatinine.

J. Appl. Physiol. 5 544 1953

41.- PEARCE M.L. et NEWMAN E.V.

Some postural adjustment of salt and water

J.Clin. Invest 33 1089 1954

42.- PEARCE M.L.

Effects of vagotomy and denervation of the carotid sinus on diuresis following plasma volume expansion

Canada. J. Bioch. & Physiol. 37 81 1959

43.- PETERSDORF R.G. et WELT

Effect of an infusion of hyperoncotic albumin on secretion of water and solutes

44.- ROMANI J.D.

L'hyperaldosteronisme secondaire de l'insuffisance cardiaque - Etude pathogénique et implications physiopathologiques

Presse Médicale 68 441 1960

45.- ROMANI J.D.

Le dosage de l'aldostérone urinaire - Technique - Résultats

Presse Médicale 66 837 1958

46.- ROMANI J.D.

L'influence des substances diurétiques sur la sécrétion de l'aldostérone (à paraître)

1. The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation

$$f(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt, \quad (1)$$

where x is a real number. It is shown that the function $f(x)$ is continuous and differentiable on the whole real axis. The derivative of the function is found to be

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2}. \quad (2)$$

It is also shown that the function $f(x)$ is bounded on the whole real axis. The maximum and minimum values of the function are found to be

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \pi. \quad (3)$$

It is also shown that the function $f(x)$ is concave down on the whole real axis. The inflection point of the function is found to be

$$x = 0, \quad y = \frac{\pi}{2}. \quad (4)$$

$$f(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = \arctan x. \quad (5)$$

It is also shown that the function $f(x)$ is periodic with period π . The period of the function is found to be

$$T = \pi. \quad (6)$$

$$f(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = \arctan x. \quad (7)$$

It is also shown that the function $f(x)$ is symmetric about the line $x = 0$. The axis of symmetry of the function is found to be

$$x = 0. \quad (8)$$

$$f(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = \arctan x. \quad (9)$$

It is also shown that the function $f(x)$ is increasing on the whole real axis. The rate of increase of the function is found to be

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2}. \quad (10)$$

$$f(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = \arctan x. \quad (11)$$

It is also shown that the function $f(x)$ is concave down on the whole real axis. The inflection point of the function is found to be

47.- ROSENFELD G., ROSENBERG E., UNGAR F. et DORFMAN R.I.

Regulation of aldosterone like material

Endocrinology 58 255 1956

48.- SIEKER H.O., GAUER O.H. et HENRY J.P.

Effect of continous pressure breathing on water and electrolytes excretion by the human kidney

J. Clin. Invest. 33 572 1954

49.- SMITH H.W.

Salt and water volume receptors

Am. J. Méd. 23 623 1957

50.- STRAUSS M.B., DAVIS R.R., RASENBAUM J.D. et ROSSMEISL E.C.

Production of increased sodium excretion by the hypotonic expansion of extracellular fluid

J. Clin. Invest. 80 31 1952

51.- THOMPSON D.D. et PITTS R.F.

Effect of alterations of renal arterial pressure on sodium and water excretion

Am.J. Physiol. 490 169 1952

52.- VEYRAT R. ENGEL E. DEMANET J.C. et MACH R.S.


Influence de saignées et de diurétiques sur l'exorétion urinaire de l'aldostérone chez les cardiaques

Path. & Biol. 7 427 1959

53.- VIAR W.N., OLIVER B.B., EISENBERG S., LOMBARDO T.A., WILLIS F.
et HARRISON T.R.

Effect of posture and of compression of the neck on excretion of electrolytes and glomerular filtration : Further studies

Circulation 3 : 105 1951



- 54.- WESTON R.E., HANENSON B.I., GROSSMAN J., BERDASCO G.A.,
WOLFMAN et LEITER L.

Evidence for a homeostatic mechanism regulating
body fluid volume in non oedematous human subjects

Fed. Proc. 13, 163 1954

- 55.- WESTON R.E., HANENSON I.B., GROSSMAN J., BERDASCO G.A. et
WOLFMAN M.

Natriuresis and chloruresis following pitressin
induced water retention in non edematous patients :
evidence of a homeostatic mechanism regulation body
fluid volume

J. Clin. Invest. 32/6 611 1953

- 56.- WESTON R.E., HANENSON I.B., GROSSMAN J., HOROWITZ H.B. et
LEITER L.

Evidence for a homeostatic mechanism regulating body
fluid volume in non edematous human subjects

Fed. Proc. 13 163 1954

- 57.- WELT L.G. et ORLOFF J.

Effects of an increase in plasma volume on metabolism
and excretion of water and electrolytes by normal
subjects

J. Clin. Invest. 30 751 1951

- 58.- WEISS et WILKINS R.W.

Nature of cardiovascular disturbances in nutritional
deficiency states (Béri-Béri)

Ann. Int. Med. 11 104 1937

DEUXIEME PARTIE

I.- HYPOPHYSE

a.- Hypophysectomie

b.- Action de l'A.C.T.H.

in vivo

in vitro

II.- CENTRES DIENCEPHALO-MESENCEPHALIQUES

a.- Leur mise en évidence

b.- Historique an (pathologie traumatique et
neuro-chirurgicale
(pathologie médicale

c.- Observations cliniques

d.- Calcul statistique et Discussion

III.- RESUME

IV.- BIBLIOGRAPHIE

I.- RÔLE DE L'HYPOPHYSE

A.- HYPOPHYSECTOMIE

Depuis la mise au point de l'hypophysectomie par P. SMITH, en 1929, les physiologistes endocrinologues remarquèrent que les animaux opérés ne présentaient qu'un déficit modéré de la fonction minéralocorticoïde.

Complications dues au déficit des autres glandes endocrines mises à part, ils survivaient bien en régime normosodique, alors que les animaux surrénalotomisés nécessitent un régime très riche en sel.

GREEP et DEANE, (65-77) au cours de leurs travaux sur la cytochimie des corticosurrénales, ont mis en évidence la modicité des changements que provoque l'hypophysectomie au niveau de la couche glomérulée, comparativement à l'importante atrophie des couches réticulée et fasciculée. Ce fait constitue un des arguments (l'autre étant les changements cytochimiques qu'on obtient en faisant varier le régime) qui les a amenés à localiser, dans cette couche, la fonction minéralocorticoïde.

Ces résultats ont été très controversés en leur temps, puis pleinement confirmés. En particulier, ROMANI, (94) a démontré en 1952 que l'atrophie surrénalienne provoquée par la cortisone épargne la glomérulée.

Le dosage de l'aldostéronurie, puis de l'aldostéronémie a permis de chiffrer cette indépendance. SINGER et STACK-DUNNE, (97), ont trouvé, chez le rat hypophysectomisé, une sécrétion importante. RAUSCHKOLB, FARRELL et KOLETSKY, (91), donnent, chez le chien, une aldostérone égale à la moitié de la normale et, dans une autre série expérimentale (92), un taux s'approchant de deux tiers. Le même phénomène se retrouve en clinique humaine au cours du panhypopituitarisme et de l'hypophysectomie thérapeutique.

LUETCHER et AXERD, (87), HERNANDO et collaborateurs, (78), ont rapporté des taux d'excrétion d'aldostérone normaux chez des patients panhypopituitaires ou hypophysectomisés ; LIDDLE, DUNCAN et BARRTER, (85), trouvent, chez un malade semblable, une réponse hyperaldostéronurique normale au cours d'un régime désodé. SHEENAN et ALBEAUX FERNET, (1) concluent l'étude de la maladie de Sheenan en disant que le métabolisme des électrolytes n'est pas très altéré et que ce fait est dû à la persistance de la production d'aldostérone, qui contraste avec l'écroulement des autres corticoïdes surrénaliens.

Nous donnons, à titre d'illustration, un exemple clinique de chacun de ces syndromes.

OBSERVATION CLINIQUE

Hypophysectomie pour Exophtalmie Maligne

Notre malade, âgée de 62 ans, a présenté, quelques années après une ménopausse tardive et sans histoire, une maladie de Basedow, singulière par l'absence du goître et l'importance des signes oculaires. Le traitement par les anti-thyroïdiens, le repos et les sédatifs, a amélioré le métabolisme de base (de + 130 % à + 60 %), la tachycardie, l'amaigrissement, mais semble avoir accéléré l'évolution d'une véritable exophtalmie maligne. En quelques mois, l'état oculaire est devenu catastrophique :

- . exophtalmie 24 OD, 23 OG,
- . cécité OD, un vingtième OG,
- . enfin, un début d'atrophie papillaire.

Il fut alors effectué une hypophysectomie par voie haute. Les suites en furent bonnes :

- . retour à la vision (sept dixièmes OD, quatre dixièmes OG),
- . diminution de l'exophtalmie (17 OD, et OG).

Cliniquement, un diabète insipide (qui s'est amélioré progressivement), des incidents hypoglycémiques, la disparition des signes de la série basedowienne, ainsi que la nécessité d'une thérapeutique corticosurrénalienne substitutive ont donné l'impression d'une hypophysectomie efficace. Seul un signe discordant, le FSH urinaire, est resté élevé, à 48 U_s souris.



Voilà les résultats d'une épreuve d'hyperaldostéronurie par désodation, et de freination par régime hy persodé :

<u>ALDOSTERONE</u>	<u>S O D I U M</u>			<u>P O T A S S I U M</u>		
	<u>apport</u>	<u>urine</u>	<u>plasma</u>	<u>apport</u>	<u>urine</u>	<u>plasma</u>
4	1 g.5	1g.95	137M Eq	2 g.	1 g.6	4 M Eq
21	-200mg	1g4	139 M Eq	2 g.4	2 g.1	4 M Eq 2
32	-200mg	0g.43	139 M Eq	2 g.2	1 g.7	4 M Eq 2
20	-200mg	0g.58	139 M Eq	2 g.1	1 g.5	4 M Eq 4
7	8 g.	4 g.	141 M Eq	1 g.8	2 g.4	4 M Eq 4

EN CONCLUSION :

L'hyperaldostéronurie, sous l'effet de la déprivation sodique, a été tout à fait normale. (L'explication que nécessite le taux relativement élevé sous l'effet de la surcharge sodique, peut être fournie par l'important déficit entraîné par l'épreuve précédente.)

OBSERVATION CLINIQUE

Panhypopituitarisme

Il s'agit d'un tableau absolument typique de la maladie de Sheehan.

Après une puberté normale à 13 ans, la patiente a joui d'une bonne santé parfaite jusqu'à l'âge de 20 ans. Elle eut alors une grossesse assez pénible et suivie d'un accouchement par le siège, très long, avec des lésions importantes et une hémorragie de la délivrance (qui a provoqué une perte de connaissance et nécessité des transfusions sanguines). Après l'accouchement, l'asthénie de la maladie prolongea l'hospitalisation de plus d'un mois. Il n'y eut pas de montée lactée. L'aménorrhée s'installa d'emblée et dura pendant 20 ans. Elle s'accompagne d'asthénie psychique (malade apathique, découragée), physique (impossibilité de tout travail important, en particulier debout), génital (frigidité, puis refus de rapports). Elle devint frileuse, pâle, et cessa de brûler au soleil.

L'examen clinique évoque un déficit endocrinien pluriglandulaire.

La peau était sèche et pâle. Les aréoles mammaires et la région génitale étaient dépigmentées. La pilosité axillaire et génitale a disparu, ainsi que la partie externe des sourcils. L'atrophie génitale touchait les grandes et les petites lèvres, la muqueuse vaginale (aucun signe d'imprégnation hormonale), l'utérus, de très petit volume.

Les examens de laboratoire ont confirmé l'origine hypophysaire de la maladie.

FIXATION DE L'IODE RADIOACTIF

	<u>Six heures</u>	<u>Vingt-quatre heures</u>
Base	15 %	34 %
après T S H	49 %	59 %

THE HISTORY OF THE

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

EPREUVES A L'A C T H

	Eosino	17 Céto	17 Hydroxy	C R T
Beso	144	2 mg. 3	0 mg. 8	1 mg. 2
après ACTH :				
1er jour	58 %	3 mg. 8	3 mg. 8	4 mg. 7
2° "	80 %	7 mg. 2	6 mg. 8	7 mg. 2
3° "	71 %	7 mg. 5	5 mg. 2	5 mg. 2
4° "	42 %	8 mg. 7	5 mg. 3	5 mg. 3

L'épreuve de stimulation par les gonadotrophines n'a pas été faite.

A cette maledo, qui présentait donc un tableau complet de panhypopituitarisme, a été faite une :


EPREUVE DE RESTRICTIONS SODIQUES

	Aldostérone	Na urinaire	K urinaire
Beso	1 X 2	1,972	1,988
régime désodé (moins de 200 M Eq de Na)			
1er jour	.6 X 8	2,91 (?)	2,978
2° "	10 X 8	0,986	2,973

EN CONCLUSION :

L'augmentation de l'aldostéronurie a été entièrement normale.

(Signalons qu'une thérapeutique substitutive thyroïdienne, corticosurrénale et oestrogénique a transformé le patient).



B.- ACTION DE L'A.C.T.H.

Les injections d'A C T H provoquent une augmentation constante, mais faible, de la sécrétion d'aldostérone; augmentation beaucoup moins forte que la montée correspondante du cortisol, ou l'hyperaldostéronurie induite, soit par l'activité, soit par le régime désodé. Nous en donnons un exemple chez un sujet-témoin en bonne santé.

OBSERVATION

Femme en bonne santé.

REGIME	TRAITEMENT	ALDOSTERONE	17 HYDROXY. Méthode REDDY
standard libre	sans	3 X 2	7 mg. 5
" "	"	2 X 8	non fait
" "	ACTH (2 ^e jour)	6 X 4	46 mg.
" "	ACTH (3 ^e jour)	6 X 8	53 mg.
" "	sans (3 j. après ACTH)	4 X 2	3 mg. 3
- 200 mg. Na	sans	15 X 6	non fait
- 200 mg. Na	dans	18 X 6	9 mg. 3
- 200 mg. Na	ACTH (2 ^e jour)	16 X 2	46 mg. 4

REMARQUES :

Le dosage des 17 hydroxy nous montre des chiffres de base normaux et une réponse à l'ACTH de 500 % à 1.000 %.

Sous l'effet de l'ACTH en régime normal, l'aldostérone ne fait que doubler.

Par contre, sous le régime désodé strict, elle augmente de 500 % et alors n'est plus influencée par l'ACTH.

ELLIOT et Collaborateurs, (67), MULROW, GANOND et Collaborateurs, n°10, ont étudié l'action de l'A.C.T.H. sur des surrénales en survie in vitro. Non seulement, les A.C.T.H. commerciales, mais aussi des produits hautement purifiés, ont une action faible mais constante sur l'excrétion de l'aldostérone.

DAVIS et Collaborateurs, (64), en poursuivent l'étude de l'hyperaldostéronisme induit par la constriction chronique de la veine cave inférieure (que nous avons déjà vu) signalent une chute de 76 à 97 %, après hypophysectomie, chute qu'on peut annuler de nouveau par l'A.C.T.H.

EN RESUME :

L'hypophyse joue, dans les régulations de l'excrétion de l'aldostérone, un rôle certain, mais non primordial. Les effets de son ablation sont masqués par d'autres mécanismes régulateurs dans des conditions habituelles, mais ils émergent lorsque les circonstances imposent une résection adaptative importante (quelle soit, d'ailleurs, nocive ou bénéfique).

11.- CENTRES DIENCEPHALO-MESENCEPHALIQUES

A.- LEUR MISE EN ÉVIDENCE

Lorsqu'on fournit à un animal une respiration assistée, une régulation thermique, une pression artérielle dirigées pharmacologiquement, il est possible de le priver de l'ensemble de son encéphale ou des parties de celui-ci.

FARRELL et Collaborateurs, (69), on se servent de cette technique classique en physiologie générale, ont rapporté l'existence de deux centres diencephaliques, dont la lésion ou l'ablation entraîne une augmentation pour l'un, une diminution pour l'autre, de l'aldostéronémie. Les mêmes auteurs purent provoquer des microlésions par des techniques stéréotaxiques, et confirmèrent ces résultats.

Remarquons, néanmoins, que l'importance des dégâts éloignent des conditions physiologiques et risquent de faire interpréter des effets primaires et secondaires. En particulier, GANOND et Collaborateurs, (71), critiquèrent sévèrement la technique en mettent en évidence une hyperaldostéronémie non spécifique et consécutive au "stressor" que constitue la canulation de la veine surrenalienne - résection qui n'a pas lieu après lésion des centres sécréteurs d'ACTH - qu'on peut rétablir par une injection d'ACTH, et qui n'est donc pas une preuve de la spécificité des centres lésés. Nous reviendrons sur le problème des localisations, en traitant les hormones adrénoglomérulotrophiques,

... ..

...

... ..

... ..

... ..

B.- HISTORIQUE

PATHOLOGIE TRAUMATIQUE et NEUROCHIRURGIE :

En 1963, deux neurochirurgiens, COOPER et CREVIER, (63), ont décrit un syndrome isolé de fuite sodique à la suite des interventions pour anévrisme de la base ou tumeurs.

En 1954, MOORE rapporte, passent en revue "les syndromes à sodium bas en chirurgie" qu'il existe un syndrome post-traumatique associant une natrurie massive et une hyponatrémie et qu'il le traite, sur des données empiriques, par des quantités importantes de sérum isotonique, plutôt que par du sérum hypertonique. (88)


A la même époque, CORT signale un autre cas de fuite sodique, provoqué par une tumeur thalamique très postérieure. Il nous semble qu'il soit possible de rattacher ces cas et d'autres cités plus récemment (PETIT DUTAILLIS et Bernard WEILL, n° 90) à une sidération de la sécrétion de l'aldostérone. (CORT, 61)

Le cas inverse, à savoir un hyperaldostéronisme aigu, à la suite d'un traumatisme crânien ou d'une intervention de neurochirurgie, n'a pas été isolé, à notre connaissance. (Peut être à cause du fait qu'une rétention sodique est masquée, dans le cas de l'intégrité du système anti-diurétique, par une rétention aqueuse).

quant à la rétention sodique contemporaine d'un envahissement de l'espace cellulaire par le sodium, souvent décrit, nous ne pouvons la rattacher à l'hyperaldostéronisme, fait d'arguments directs.

PATHOLOGIE MEDICALE :

Les deux premiers cas de dysfonctionnement non traumatiques ont été analysés par KLOTZ et Collaborateurs, (79 - 80 - 81 - 82) En poursuivent leurs travaux sur des troubles du métabolisme de



l'oeu dans certaines obésités où il existait une mauveise inhibition du système antidiurétique, en réponse à la surcharge aqueuse, ces auteurs ont pu, dans les deux cas suivants, impliquer un hyperaldostéronisme :

- Une malade de 33 ans présentait des variations pondérales très rapides, des troubles de glucorégulation, une courbe thermique désordonnée, une hypokaliémie. Un dosage de l'aldostéronurie (fait par MACH) donnait des chiffres entre 34 et 40 $\times$ par jour. Au cours de l'évolution, il apparut des amyotrophies type Steinert.
- Une autre malade associeit, dans les suites d'une castration, un hyperaldostéronisme, des grandes variations pondérales, une fièvre désarticulée, une insomnie, tous troubles guéris par une opothérapie oostrogéno-androgénique.

A la suite de ces travaux, nous avons été amené à effectuer un certain nombre de dosages de l'aldostéronurie chez des obèses de même type clinique, qui se sont avérés normaux.

Par contre, le dosage de l'aldostéronurie, après l'épreuve orthostatique, a donné des résultats intéressants.

Rappelons d'abord les chiffres que l'on obtient avec les sujets-témoins (technique décrite page 11).

- chez les sujets normaux, au repos, les chiffres s'échelonnent entre 2 $\times$ 8 et 7 $\times$ 9, avec une moyenne de 4 $\times$ 6 ;
- chez les sujets normaux ambulatoires, menant une vie active normale, les chiffres s'échelonnent de 4 $\times$ 8 à 12 $\times$ 6, avec une moyenne de 8 $\times$ 5 (96)

Le rapport $\frac{\text{activité-repos}}{\text{repos}}$ x 100 est donc inférieur à 100 % (86 %).

1. The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem of the existence of a solution of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters α and β .

2. In the second part, we consider the case when the parameters α and β are small. In this case, the system of equations (1) can be written in the form of a perturbation series in powers of the small parameters α and β .

3. In the third part, we consider the case when the parameters α and β are large. In this case, the system of equations (1) can be written in the form of a perturbation series in powers of the small parameters $1/\alpha$ and $1/\beta$.

4. In the fourth part, we consider the case when the parameters α and β are of the order of unity. In this case, the system of equations (1) can be written in the form of a perturbation series in powers of the small parameters α and β .

5. In the fifth part, we consider the case when the parameters α and β are of the order of unity. In this case, the system of equations (1) can be written in the form of a perturbation series in powers of the small parameters α and β .

6. In the sixth part, we consider the case when the parameters α and β are of the order of unity. In this case, the system of equations (1) can be written in the form of a perturbation series in powers of the small parameters α and β .

7. In the seventh part, we consider the case when the parameters α and β are of the order of unity. In this case, the system of equations (1) can be written in the form of a perturbation series in powers of the small parameters α and β .

8. In the eighth part, we consider the case when the parameters α and β are of the order of unity. In this case, the system of equations (1) can be written in the form of a perturbation series in powers of the small parameters α and β .

9. In the ninth part, we consider the case when the parameters α and β are of the order of unity. In this case, the system of equations (1) can be written in the form of a perturbation series in powers of the small parameters α and β .

C.- OBSERVATIONS CLINIQUES

Voici le résumé de ces 6 observations :

OBSERVATION 1 :

Une obésité de 30 %, avec un important élément de rétention hydrique. Prise de poids amorcée à la suite de conflits familiaux. L'activité professionnelle exige l'orthostatisme 10 heures par jour.

Au repos 8×5 , orthostatisme $58 \times$ $\frac{\text{orth-repos}}{\text{repos}} \times 100 = 585 \%$

OBSERVATION 2 :

Obésité de 180 %. Obésité qui a débuté à 18 ans, à la suite d'une grossesse. Subit, à 27 ans, une hystérectomie avec castration, suivie d'une deuxième poussée pondérale. Enfin, un traitement cortisonique prolongé (pour une dyspnée asthmatiforme) a fait prendre 40 kg. en 6 mois.

A l'examen, le malade présenteit :

- un faciès acromégaloïde, une saillie des arcades orbitaires, un élargissement des extrémités, un œdème palpébral, une protrusion discrète des globes oculaires et une hyperostose interne débutante.

Par ailleurs, des bouffées de chaleur, une fièvre désarticulée, une polydypsie. Enfin, une hypoglycémie provoquée du type paradabétique, une forte stéroïdurie après ACTH :

. 17 céstéroïdes : 9 mg. à 24 mg.

. 17 hydroxystéroïdes : de 4 mg. à 25 mg.

L'aldostéronurie passe de 5×6 à 22×9 , donc une augmentation de 309 %.

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

OF THE UNITED STATES OF AMERICA

BY JAMES M. SMITH

THE HISTORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA, FROM THE FIRST SETTLEMENTS TO THE PRESENT TIME. IN THREE VOLUMES. VOL. I.

NEW YORK: PUBLISHED BY J. B. LIPPINCOTT, 15 N. 2ND ST. 1854.

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

OF THE UNITED STATES OF AMERICA, FROM THE FIRST SETTLEMENTS TO THE PRESENT TIME. IN THREE VOLUMES. VOL. I.

BY JAMES M. SMITH

THE HISTORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA, FROM THE FIRST SETTLEMENTS TO THE PRESENT TIME. IN THREE VOLUMES. VOL. I.

NEW YORK: PUBLISHED BY J. B. LIPPINCOTT, 15 N. 2ND ST. 1854.

THE HISTORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA, FROM THE FIRST SETTLEMENTS TO THE PRESENT TIME. IN THREE VOLUMES. VOL. I.

OBSERVATION 3 :

Une obésité de 100 %. La première poussée a été consécutive à un stressor particulièrement violent et contemporaine d'une aménorrhée. Après la guérison de celle-ci, et une grossesse, un plateau et une nouvelle ascension pondérale au cours d'un syndrome dépressif causé par des ennuis familiaux graves.

L'aldostéronurie, de 9 γ 4, passe à 20 γ 4, donc une augmentation de 116% .

OBSERVATION 4 :

A la suite d'un traumatisme crânien, le malade a présenté un coma de 9 heures, une polydypsie de 5 à 6 litres, montant à 20 litres au cours de deux grossesses et rythmant des prises de poids. S'y ajoute, au cours de l'évolution, une polyphagie alternant avec des accès anorexiques, une fièvre irrégulière, des troubles du type maniaco-dépressif et des absences.

L'épreuve d'orthostatisme fait passer l'aldostéronurie de 5 γ à 15 γ , donc une augmentation de 180 %.

Il est à remarquer qu'une épreuve de restriction sodique a été parfaitement bien supportée par le malade qui n'a uriné que 250 cc. en 8 heures.

OBSERVATION 5 :

Malade âgée de 48 ans, obésité de plus de 40 %.
Dysménorrhée très irrégulière avec périodes d'aménorrhée et poussées pondérales. Anxiété permanente,

Au repos : 5 γ

Après l'épreuve : 13 γ 5 ; augmentation de 170 %.

100

The first of these is the fact that the
 government has been unable to secure
 the necessary funds to carry out its
 policy of non-interference in the
 internal affairs of the country.

The second is the fact that the
 government has been unable to secure
 the necessary funds to carry out its
 policy of non-interference in the
 internal affairs of the country.

100

The third is the fact that the
 government has been unable to secure
 the necessary funds to carry out its
 policy of non-interference in the
 internal affairs of the country.

The fourth is the fact that the
 government has been unable to secure
 the necessary funds to carry out its
 policy of non-interference in the
 internal affairs of the country.

The fifth is the fact that the
 government has been unable to secure
 the necessary funds to carry out its
 policy of non-interference in the
 internal affairs of the country.

100

The sixth is the fact that the
 government has been unable to secure
 the necessary funds to carry out its
 policy of non-interference in the
 internal affairs of the country.

The seventh is the fact that the
 government has been unable to secure
 the necessary funds to carry out its
 policy of non-interference in the
 internal affairs of the country.

OBSERVATION 6 :

Il ne s'agit pas d'une obésité (66 kg. pour 1, 63 m.), mais des poussées oédémateuses, allant jusqu'à 15 kg. avec soif et oligurie orthostatiques, tous troubles guéris par le repos au lit. Par ailleurs, une hypothermie avec poussées à 39-40°, sans étiologie évidente ; enfin, troubles du sommeil.

Le malade a subi une castration et a été accablée par des difficultés familiales et sociales particulièrement graves.

L'aldostéronurie a été, au repos, à 13 γ ⁵ (chiffre un peu fort) et pendant l'orthostatisme de 25 γ .

TABLEAU RECAPITULATIF

	Aldostéronurie au repos	Aldostéronurie orthostatique	<u>orthost-repos</u> x 100 repos
Témoins (moyenne)	4 γ 6	7 γ 9	86 %
Observ. 1	8 γ 5	58 γ	585 %
Observ. 2	5 γ 6	22 γ 9	309 %
Observ. 3	9 γ 4	20 γ 4	116 %
Observ. 4	5 γ	14 γ	180 %
Observ. 5	5 γ	13 γ 5	170 %
Observ. 6	13 γ 5	25 γ	85 %

1. The first part of the report is a general
 introduction to the subject of the study.
 2. The second part is a detailed description of the
 methods used in the study.

3. The third part is a discussion of the results of the study.
 4. The fourth part is a conclusion.

5. The fifth part is a list of references.
 6. The sixth part is an appendix.

7. The seventh part is a list of figures.

8. The eighth part is a list of tables.

Date	Time	Location
1910	10:00	New York
1911	11:00	New York
1912	12:00	New York
1913	13:00	New York
1914	14:00	New York
1915	15:00	New York
1916	16:00	New York
1917	17:00	New York
1918	18:00	New York
1919	19:00	New York
1920	20:00	New York
1921	21:00	New York
1922	22:00	New York
1923	23:00	New York
1924	24:00	New York
1925	25:00	New York
1926	26:00	New York
1927	27:00	New York
1928	28:00	New York
1929	29:00	New York
1930	30:00	New York
1931	31:00	New York
1932	32:00	New York
1933	33:00	New York
1934	34:00	New York
1935	35:00	New York
1936	36:00	New York
1937	37:00	New York
1938	38:00	New York
1939	39:00	New York
1940	40:00	New York
1941	41:00	New York
1942	42:00	New York
1943	43:00	New York
1944	44:00	New York
1945	45:00	New York
1946	46:00	New York
1947	47:00	New York
1948	48:00	New York
1949	49:00	New York

D. - CALCUL STATISTIQUE ET DISCUSSION

Avant de présenter la discussion statistique de ces résultats, signalons qu'une erreur systématique a pu être introduite de plusieurs façons ; par exemple, du fait que nos sujets, soumis au régime alimentaire libre normosodique, n'étaient pas dans des conditions matérielles identiques (les témoins à l'hôpital LeJannec, les obèses à Bichet) et qu'un facteur psychologique (désir de maigrir) a pu influencer aussi sur leur alimentation. Enfin, les témoins étaient ambulatoires libres, alors que les obèses subissaient un orthostatisme obligatoire de 10 heures.

$$T = \frac{MT \text{ sujets obèses } (o) - MT \text{ sujets normaux } (n)}{\sqrt{\frac{s(\Delta o)^2 + s(\Delta n)^2}{N o + N n - 2}} \times \frac{N o + N n}{N o \times N n}}$$

o u MT présente le moyen terme arithmétique

s la somme

o la différence dans la série entre une mesure individuelle et le MT chez les obèses ;

n la différence dans la série entre une mesure individuelle et le MT des sujets normaux ;

No le nombre d'obèses

et Nn le nombre de sujets normaux ;

ce qui donne (les chiffres de témoins étant au repos, en 8/24 h. :

4, 4, 7, 5, 4, 5, 5, 8, 3, 0, 6, 0, 3, 8, 3, 0, 4, 3, 3, 2, 2,
8, 4, 2, 3, 5, 4, 5, 5, 9, 7, 0)

$$T = \frac{6,7 - 4,6}{\sqrt{\frac{15,52 + 34,93}{16 + 5 - 2} \times \frac{16 + 5}{16 \times 5}}} =$$

$$\frac{2,1}{\sqrt{2,7 \times 0,2625}} = \frac{2,1}{0,835} \quad \text{donc } T = 2,515$$

Pour un degré de liberté de 19 ($16 + 5 - 2$), les tables donnent :
• 2,093 pour une probabilité de 5 %
et • 2,861 pour une probabilité de 1 %.

Nous pouvons donc conclure que, en excluant le cas 6, il n'existe entre l'aldostéronurie de repos de nos malades et l'orthostatisme de repos de témoins qu'une différence "probablement significative". En incluant le cas 6 (qu'en fait nous n'avons pas le droit d'exclure), la même formule nous montre que la différence n'est vraisemblablement due qu'au hasard.

Pour éviter de nous répéter, nous ne donnerons pas le détail du calcul concernant l'aldostéronurie après l'orthostatisme. Il donne, pour un degré de liberté de 16 ($12 + 6 - 2$) un T supérieur à 3, donc "statistiquement significatif" (c'est-à-dire avec une probabilité que la différence soit due au hasard inférieure à 1 %).

R E S U M É

Au cours de certains états post-traumatiques ou neuro-chirurgicaux, il a été décrit des troubles du métabolisme sodique.

Nous avons mis en évidence, dans 6 cas d'obésité consécutifs à des stressors psychiques graves ou à un déficit endocrinien périphérique (castration) et présentant un tableau de dérèglement d'encéphalohypophysaire, une excrétion d'aldostérone normale ou un peu élevée au repos, mais franchement pathologique après une épreuve d'orthostatisme.

Ce fait, s'il était confirmé (d'autres malades sont en cours d'études) apporterait des notions intéressantes sur un chaînon étio-pathogénique d'un type d'obésité particulier, mais qui nous semble non rare. Il aurait évidemment des implications thérapeutiques qui sont en cours de vérification.

THE HISTORY OF THE

OF THE

... ..

... ..

... ..

B I B L I O G R A P H I E

- 59.- ALBEAUX-FERNET (M.) et SHEEHAN
Glandes endocrines - Maladie de SHEEHAN
Encyclop. Méd. Chirurg.
- 60.- ALBEAUX-FERNET (M.), BUGAR (P.) et ROMANI (J.D.)
Les variations des stéroïdes urinaires au cours
de la sénescence : 17 céto stéroïdes neutres corti-
coïdes et aldostérone
Presse Médicale 66 869 1958
- 61.- CORT J.H. Cerebral salt wasting
Lancet 266 752 1954
- 62.- COOPER I.S. Disorders of electrolytes and water metabolism
following brain surgery
Journal of Neurosurgery 10 389 1953
- 63.- COOPER I.S. et CREVIER P.H.
Neurogenic hyponatremia and hyperchloremia
J. Clin. Endoc. Metab. 12 821 1952
- 64.- DAVIS J.O., YANKOPOULOS N.A., LIEBERMAN F., HOLMAL J., BAHN R.C.
The role of the anterior pituitary in the control of
aldosterone secretion in experimental secondary hyper-
aldosteronism
J. Clin. Investigation 39 1960
- 65.- DEANE H.W. et GREEP R.O.
Morphological and histochemical study of the rat's
adrenal cortex after hypophysectomy
Am. Ass. 79 117 1946

THE HISTORY OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

66.- DEANE H.W.

Pituitary adrenal function

Am. Ass. for the advancement of science 31 1951

67.- ELLIOT F.H. et SCHALLY A.V.

Canad. J. Biochem. and Physiol. 33 174 1955

68.- FARRELL G.

Physiological factors with influence secretion of aldosterone.

Rec. Progress. Hormone Resach. 15 275 1959

69.- FARRELL G. L. FLEMING R.B., RAUOSCHOLB E.W., Mac CALLY M et ANDERSON C.H.

Stereogenic properties of purified corticotropins endocrinology 62 506 1958

70.- FARRELL G.L., RAUOSCHOLB E.W. et ROYCE P.C.

Secretion of aldosterone by the adrenal of the dogs
Effects of hypophysectomy and A.C.T.H.

Amer. J. of Physiol. 182 269 1955

71.- CANONG W.F., LIEBERMAN A.H., DALLY W.J.R., YUEN V.S., MULROW P.J. LUETCHER J.A. Jr, BAILEY R.E.

Aldosterone secretion in dogs with hypothalamic lesion

Endocrinology 65 18 1959

72.- CANONG, W.F., MULROW H.

Amer. J. of Physiol. 195 337 1958

73.- GIROUD C.J.P., SAFFRAN M., SCHALLY A.V., STACHENKO J. et VENNING E.H.

Production of aldosterone rat's adrenal glands in vitro

Proc. Soc. Exp. Biol and Med. 92 855 1956

74.- GIROUD C.J.P., STACHENKO J. et PILETTA P.

In vitro studies of the fonctionnal sonation of the adrenal cortex and of the production of aldosterone

Int. Symp. Aldosterone J. & A. CHURCHILL, Edit.(LONDON)
56 1958

1. *Phragmites* (common in the marshes of the lower Mississippi River and in the coastal marshes of the Gulf of Mexico).

Journal of Management Studies, 19(1), 67-80.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

[illegible]

• *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 2561-2566

[illegible][illegible]

1890

[illegible]

75.- GIROUD C.J.P., STACHENKO J., VENNING E.H.

Secretion of aldosterone by the zone glomerulosa of rat adrenal glands, incubated in vitro

Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 92 154 1956

76.- GREEP R.O.

Preliminary observation on the regulation of the adrenal cortex to electrolyte metabolism in the rat, Pituitary adrenal function

Amer. Ass. Scienc. 1950

77.- GREEP R.O. et DEANE H.W.

Annals of NEW YORK Acad. Sciences 50 596 1949

78.- HERNANDO L., CRABBE J., ROSS E.J., REDDY W.J., RENOLD A.E.
NELSON D.H., THORN G.W.

Clinical experience with a physico chemical method for estimation of aldosterone in urine metabolism

6 518 1957

79.- KLOTZ H.P. et KAHN F.

Le contrôle central de la sécrétion d'aldosterone

Sem. Hôp. PARIS 1957 33 3763 1957

80.- KLOTZ H.P., FOURNIER, SAINT SAENS, BONNEFOY, ELMALEH

Sem. Hôp; PARIS 65 3362 1956

81.- KLOTZ H.P., ROMANI J.D., ELMALEH

Mouvements de l'eau dans les obésités, importance des facteurs centraux dans leur déterminisme

Bull. et Mem. Soc. Med PARIS: séance du 18-11-60
(à paraître)

82.- KLOTZ H.P., SAINT SAENS, BONNEFOY

Annales d'Endocrin. 18 61 1957

83.- LANE N. et BODO R.C.

Generalized adrenocortical atrophy in hypophysectomy dogs and correlated functional studies

Am.J. Physiol. 168 1 1952

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4}$

1990

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

.....

100

84.- LEWY C.H. et CASSMAN F.K.

Am. J. of Physiol. 112 504 1935

85.- LIDOLE C.W., DUNCAN J.A. et BARTTER F.C.

Duel mecanism regulating endroncortical function in man

Amer. J. Med. 21 380 1956

86.- LLAURADO J.C.

Aldosterone excretion following hypophysectomy in man;
relation to urinary na/K ration metabolism

6 5556 1957

87.- LUETZCHER J.A. Jr, AXELRA B.J.

Sodium retaing oorticoïde in the urine of normal ohil-
dren and adults and of the patients with hypoadrenalism
on hypopituitarism

J. Clin. Endocrinal and Metab. 14 1086 1954

88.- MOORE F.D. - The low sodium syndroms of surgery

J.A.M.A. 154 379 1954

89.- MULLER A.F., RIONDEL A.M. et MANNING E.L.

Effects of corticotropin on secretion of aldosterone

Lancet 271 1021 1956

90.- PETIT-DUTAILLIS (D.) et BERNARD WEIL (E.)


Métabolisme de l'eau dans les traumatismes du orâne
Aspects neuro-endocrinien et base du traitement
hormonal

MASSON & Cie Edit. PARIS, 1958

91.- RAUOSCHKOLB E.W. et FARRELL J.L.

Evidence of the diencephalic regulation of aldosterone
secretion

Endocr. 59 526 1956



— TROISIEME PARTIE —

P L A N

1.- HISTORIQUE

- a.- Mise en évidence dans l'urine et dans le plasma
- b.- Extraits du mésencéphale et de l'épiphyse

2.- EXPERIMENTATION d'un EXTRAIT EPIPHYSAIRE GLOBAL


- a.- Cytologie et cytochimie de la glomérulée (rats)
- b.- Rétention sodique (rats)

3.- FRACTIONNEMENT de CET EXTRAIT

- a.- Formule provisoire d'un des composants
- b.- Son expérimentation

4.- DISCUSSION

5.- BIBLIOGRAPHIE



I.- HISTORIQUE

A.- MISE EN ÉVIDENCE DU PRINCIPE HORMONAL

DANS L'URINE ET LE PLASMA

Ainsi que nous l'avons vu, la méthode des micro-lésions a permis de localiser deux centres régulateurs de la sécrétion de l'aldostérone. Mais ces résultats devaient être confirmés par la mise en évidence du messenger hormonal lui-même. Ce sont les travaux d'ORTI, ROLLI, KAKEN et DUBOIS en 1957 chez l'animal, puis ceux de LUESTCHER, en 1958, qui ont permis d'affirmer l'existence de substances plasmatiques et urinaires aldostérono sécrétrices.

Reprenant la technique d'étude de sécrétion des surrénales du rat *in vitro*, utilisée par ELLIOT et SCHOLLY, par GIROUD et coll. MULROW et collaborateurs mirent dans le liquide de perfusion le résidu d'ultra-filtration d'urines humaines et montrèrent une augmentation de la sécrétion d'aldostérone hautement significative, comparée à aux effets de l'A.C.T.H. et d'autres produits biologiques.

Dans un travail récent, ROSS & MAC LEAN (1960) ont injecté l'urine des rats surrénalectomisés et soumis pendant 36 h. à un jeûne complet aux rats entiers, démontrant ainsi directement l'existence d'un principe G.T.H. et son augmentation sous l'effet de la privation hydrominérale. Il n'eut évidemment aucun effet lorsque les rats receveurs étaient surrénalectomisés.

B.- EXTRAITS DE MÉENCÉPHALE ET DE L'ÉPIPHYSE

Mais c'est encore l'Ecole de FARRELL qui a fourni la contre-épreuve en préparant des extraits des microrégions, et en se servant de chiens décébrés comme récepteurs (FARRELL G.L., RAUSCH-KOLB, FLEMING & YATSU en 1957, FARRELL, NEWMAN & REDGATE en 1958, FARRELL et collaborateurs en 1960) les animaux receveurs étaient étudiés aussi bien par le dosage du cortisol et de l'aldostérone dans la veine surrénalienne qu'au point de vue du métabolisme hydrominéral

Les premiers extraits salins acides étaient actifs à la fois sur la sécrétion de l'aldostérone et celle du cortisol. Les extraits neutres préparés à la température ordinaire se sont montrés peu efficaces, mais la préparation desdits extraits aux basses températures (au maximum 3°) a permis d'obtenir une substance aldostéro-sécrétrice dépourvue d'effets A.C.T.H.

Cette élégante technique a confirmé les travaux de GANONG (DAILY et GANONG 1958, GANONG & Collaborateurs 1959) qui discutèrent les premiers résultats de FARRELL concernant la localisation diencephalique antérieure de centres aldostéono régulateurs. Par contre, elle a révélé un fait essentiel, à savoir le rôle de l'épiphyse et des structures environnantes comme source de substance à effets G.T.H. En effet, les extraits du diencephale antérieur sont peu actifs et l'activité augmente dans la région de la commissure postérieure, du corps subcommissural (NEWMAN 1960) (organe particulièrement distinct chez certains animaux, tels les chats) et enfin dans la région de l'épiphyse elle-même. (Voir tableau)

L'étude chimique des extraits a montré que les extraits acétoniques sont actifs, et que le partage des extraits entre l'eau et l'hexane fait passer la fraction active dans l'hexane.

Les recherches chromatographiques récentes permirent la purification des extraits (dont une dose de 3 gammas provoque chez le chien l'effet stéroïdogénique maximum).

Au cours de ces recherches, les auteurs ont remarqué une augmentation de l'action G.T.H. totale pendant la purification et découvrirent qu'un des constituants des chromatogrammes avaient des propriétés à la fois anti-A.C.T.H. et anti-A.G.T.H.

Les épiphysectomies n'ont pas éclairci le problème. Pendant une courte période post-opératoire, la sécrétion de l'aldostérone est basse mais redevient normale en quelques jours pour s'élever au-dessus de la normale en quelques semaines.

Actuellement FARRELL pense que le principe A.G.T.H. siège au niveau de la commissure postérieure du corps subcommissural et de l'épiphyse. Au niveau de cette dernière, il existerait, en plus, un principe inhibiteur.

T A B L E A U
emprunté à FARRELL G.

| <u>E X P E R I E N C E S</u> | <u>Nombre
d'
animaux</u> | <u>Aldostérone en
gammas
par 100 k.per H.</u> | <u>Cortisol
en gamma par 1 kg
par heure</u> |
|---|----------------------------------|---|---|
| Témoins intacts | 9 | 31,2 $\pm$ 3,7 | 32,8 $\pm$ 3,9 |
| Témoins décérébrés
(4 h.après décérébrat.) | 8 | 7,86 $\pm$ 0,87 | 2,19 $\pm$ 0,49 |
| Témoins décérébrés | 6 | 8,5 - 0,95 | 1,72 - 0,38 |
| Animaux décérébrés +
extrait salin du di-
encéphale postérieur
comprenant l'épiphyse | 7 | 24,21 $\pm$ 3,2 $\pm$ | 1,93 $\pm$ 0,55 |
| Animaux décérébrés
+ extrait salin de
l'épiphyse seule | 6 | 30,3 $\pm$ 2,9 $\pm$ | 2,17 $\pm$ 0,51 |
| Animaux décérébrés
avec extrait acétoni-
que d'épiphyse | 4 | 25,0 $\pm$ 4,15 $\pm$ | 3,98 $\pm$ 1,03 |
| Animaux décérébrés +
la fraction hexanique
(après partition eau
hexane de l'extrait
acétonique) | 4 | 34,6 $\pm$ 4,2 $\pm$ | 3,69 $\pm$ 0,66 |
| Animaux décérébrés
+ fraction aqueuse
(après partition eau
hexane de l'extrait
acétonique) | 3 | 10,92 $\pm$ 3,2 | 9,93 $\pm$ 3,0 |

II. EXPERIMENTATION

D'UN EXTRAIT EPIPHYSAIRE GLOBAL

. - CYTOLOGIE ET CYTOCHIMIE DE LA GLOMERULEE (RATS)

TECHNIQUE

Nous avons utilisé pour la présente expérimentation 20 rats adultes, mâles, pesant 170 grammes environ, 5 d'entre eux ont servi de témoins et les 15 autres ont reçu, par voie sous-cutanée, un centimètre cube d'un extrait d'épiphyse de veau (extrait aqueux) correspondant à 0,1 gr. de glande fraîche par centimètre cube. Ces animaux ont reçu une injection quotidienne pendant deux jours consécutifs et ont été sacrifiés deux heures après la dernière injection. Tant pour les témoins que pour les animaux traités, le régime était libre et ils recevaient comme boisson de l'eau pure à volonté.

Chez chacun de ces animaux, les surrénales ont été prélevées immédiatement après la mort. La surrénale gauche a été fixée dans le formol à 10 p.100 pour l'étude des lipides soudanophiles et la surrénale droite dans l'alcool à 80° pour la mise en évidence des phosphatases alcalines. Les pièces fixées dans le formol ont été coupées à la congélation après 48 heures de séjour dans le fixateur. Les coupes de 15 μ d'épaisseur ont été traitées par la méthode de GOMORI pour la phosphatase alcaline. Nous avons d'autre part déterminé, par histométrie, la largeur moyenne de la zone glomérulée, chez les rats témoins, et chez les rats traités par l'extrait épiphysaire.

RESULTATS

Nous n'avons pas constaté de modifications du poids, ni de l'aspect macroscopique des surrénales sous l'influence de l'extrait épiphysaire. Les seules modifications sont d'ordre histométrique et histochimique. Nous les décrirons succinctement dans les lignes qui suivent :

1°.- Etude des Lipides Soudanophiles


L'étude de la répartition des lipides soudanophiles dans le cortex surrénal des rats témoins montre une disposition normale au niveau des cellules des trois zones, glomérulée, fasciculée et réticulée. La zone fasciculée et la zone glomérulée sont séparées l'une de l'autre par une petite zone dépourvue d'enclaves lipidiques, aspect normal chez le rat (J.D.ROMANI, 1952). Les cellules de la zone glomérulée contiennent de petites enclaves lipidiques réparties dans le cytoplasme, alors que celles de la fasciculée ont un aspect spongiocytaire typique.

Chez les rats traités par l'extrait épiphysaire, la fasciculée et la réticulée présentent un aspect semblable à celui des rats témoins. Seule la zone glomérulée est affectée. Elle apparaît plus large que chez les témoins - donnée que confirmera l'étude histométrique - et, surtout, elle est le siège d'une surcharge en granulations lipidiques, qui sont plus grosses et plus abondantes que chez les rats témoins. Cet aspect est diamétralement opposé à ce qui avait été constaté après injection de cortexone (J.D.ROMANI, 1952) ou la mise au repos de la zone glomérulée se traduit, au contraire, par une disparition des enclaves lipidiques.

2°.- Etude des Phosphatases Alcalines

Chez les rats témoins, la présence de phosphatase alcaline, révélée par la réaction de GOMORI, utilisant comme substrat le glycérophosphate de sodium, est limitée aux parois vasculaires; on note par surcroît une faible réaction diffuse au niveau des cellules de la zone réticulée; par contre, la réaction est totalement négative dans le cytoplasme des cellules des zones fasciculée et glomérulée. Cet aspect est typique de la surrénale, en dehors de toute stimulation corticotrope.

Chez les rats traités par l'extrait épiphysaire, on note l'apparition d'une réaction de GOMORI positive, limitée aux cellules de la zone glomérulée, et uniquement en ce point. Les cellules de la zone fasciculée ne contiennent pas de phosphatases décelables par cette réaction.



HYSTOMETRIE

La comparaison de la largeur des zones glomérulées des témoins et des animaux traités par l'extrait épiphysaire, sur coupes à la congélation et colorées par le Noir Soudan est hautement significative. Les données de cette évaluation sont consignées dans le tableau suivant :

LARGEUR DE LA ZONE GLOMERULEE DE LA SURRENALE DE RATS NORMAUX ET DE RATS TRAITES PAR UN EXTRAIT AQUEUX D'EPIPHYSE DE VEAU PENDANT 2 JOURS

| | <u>Largeur</u>
<u>de la zone glomérulée</u> : | |
|---------------|--|---------------------------------|
| | <u>Valeurs</u>
<u>extrêmes</u> | <u>Valeur</u>
<u>moyenne</u> |
| Rats témoins | 40 à 52 μ | 45 μ |
| Rats épiphyse | 60 à 80 μ | 68 μ |

La largeur de la zone glomérulée des rats témoins varie globalement de 40 à 52 μ avec une valeur moyenne de 45 μ alors que chez traités par l'extrait épiphysaire, elle varie de 60 à 80 μ avec une valeur moyenne de 68 μ . Il est donc indiscutable que l'administration, dans ces conditions, d'un extrait aqueux de glande pinéale détermine une hyperplasie de la couche glomérulée du cortex surrénal, cet extrait n'exerçant pas sur le plan morphologique d'autres effets au niveau du reste du cortex surrénal.

3.- RÉTENTION SODIQUE

Le même extrait fut utilisé pour l'étude de la diurèse sodique chez les rats entiers et surrénalectomisés.

MATERIEL & METHODES

50 rats mâles, pesant 150 et 180 grammes, ont été utilisés au cours du présent travail. L'excrétion rénale du sodium a été étudiée par la méthode de S MARCUS, L.P.ROMANOFF et G.PINCUS (1952), reprise pour des études similaires par C.M.KAGAWA, E.G.SHIPLEY et R.K.MEYER (1952) et par P.DESAULLES et R.MEIER (1956). Cette méthode consiste essentiellement à induire, chez le rat, une collecte urinaire pendant un temps fixé, en réalisant une rétention intra-vésicale par ligature de l'urèthre, au-dessous de la prostate. L'intervention est pratiquée chez le rat à jeun depuis 24 heures.

Dans les conditions de la présente expérimentation, les animaux ont été subdivisés en quatre groupes. Les animaux des deux premiers groupes ont subi simplement une ligature de l'urèthre, sous anesthésie générale à l'éther et ont reçu immédiatement après l'intervention 5 cm³ de soluté isotonique de chlorure de sodium par voie intra-péritonéale. Dix de ces animaux, qui serviront de témoins, reçoivent simplement une injection intra-musculaire de 0,5 cm³ de sérum physiologique (Groupe I); 24 autres animaux reçoivent dans les mêmes conditions 0,5 cm³ d'extrait aqueux d'épiphyse de veau (POWATINON) (Groupe II).

Les animaux des deux autres groupes subissent, au préalable, sous anesthésie à l'éther, une surrénalectomie bilatérale, en un temps. Un groupe de cinq de ces animaux ne reçoit qu'une injection de 0,5 cm³ de soluté physiologique (Groupe III), alors que l'autre groupe, de 11 animaux, reçoit 0,5 cm³ d'extrait épiphysaire, par voie intra-musculaire (Groupe IV).

Dans les quatre séries expérimentales, la période de récolte des urines a été limitée à 4 heures, à la fin desquelles les animaux ont été sacrifiés par inhalation d'éther; la vessie est prélevée en bloc et les urines sont récoltées par incision de celle-ci. Le sodium urinaire est évalué par photométrie de flamme et l'excrétion sodique est exprimée en $\mu\text{Eq}/4\text{heures}$

RESULTATS

Les résultats de ces expériences sont consignés dans le tableau de la page suivante.

Dans la série N°1 (Rats témoins), où les animaux n'ont pas reçu d'extrait épiphysaire, l'excrétion sodique varie largement entre 150 et 272 μ Eq/4 h. avec une valeur d'excrétion moyenne de 209 μ Eq/4 heures. Chez les animaux entiers, recevant 0,5 cm³ d'extrait épiphysaire de veau (Série II), l'excrétion sodique varie globalement de 45 à 160 μ Eq/4 heures et le taux d'excrétion moyen est de 92,5 Eq/4 heures

Dans cette première série d'expériences, on peut constater une nette réduction de l'excrétion urinaire du sodium sous l'influence de l'injection d'extrait épiphysaire. La comparaison statistique entre les deux séries expérimentales donne un R (+) égal à 7,8, donc très supérieur à 2; cette comparaison des moyennes des groupes I et II nous permet d'affirmer que les résultats sont statistiquement valables, donc qu'il existe une rétention très nette de sodium chez le rat non surrénalectomisé, soumis à l'action d'un extrait épiphysaire.

Dans la série N° III (Rats surrénalectomisés), l'excrétion sodique a varié globalement de 127 à 272 Eq/4 h. avec un taux d'excrétion moyen de 211 μ Eq/4 heures. Chez les animaux surrénalectomisés, traités par 0,5 cm³ d'extrait épiphysaire, l'excrétion sodique a varié globalement de 100 à 270 μ Eq/4 heures, avec un taux d'excrétion moyen de 167 Eq/4 h. La comparaison statistique des deux séries expérimentales des groupes III et IV donne une valeur de R égale à 1,4,

$$(+)\quad R = \frac{M_a - M_b}{\frac{\sigma_a^2}{n_a} + \frac{\sigma_b^2}{n_b}}$$

6 2, ou M désigne les moyennes de chaque série, σ la variance et n le nombre d'animaux de chaque série.

$$\frac{\sigma_a^2}{n_a} + \frac{\sigma_b^2}{n_b}$$

| | <u>GROUPE I</u> | <u>GROUPE II</u> | <u>GROUPE III</u> | <u>GROUPE IV</u> |
|---------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------------|---|
| | Rats nor-
maux témoin | Rats nor-
maux
+ 0,55 cc
Epiphyse | Rats sur-
rénales -
tomisés. | Rats surré-
nalectomisés
+ 0,5 cc
Epiphyse |
| Excrétion sodique
en μ Eq/4 h. | 260 | 70 | 272 | 160 |
| | 272 | 151 | 127 | 204 |
| | 194 | 145 | 270 | 135 |
| | 233 | 144 | 210 | 200 |
| | 150 | 52 | 180 | 270 |
| | 225 | 130 | | 100 |
| | 160 | 54 | | 148 |
| | 180 | 140 | | 180 |
| | 220 | 75 | | 160 |
| | 195 | 70 | | 156 |
| | | 56 | | 130 |
| | | 50 | | |
| | | 80 | | |
| | | 64 | | |
| | | 660 | | |
| | | 90 | | |
| | | 75 | | |
| | | 94 | | |
| | | 100 | | |
| | | 110 | | |
| | | 160 | | |
| | | 110 | | |
| | | 45 | | |
| | | 96 | | |
| Moyenne : | 209 | 92,5 | 211 | 167 |
| R = 7,8 | | R = 1,4 | | |
| (= > 2) | | (= < 2) | | |

donc inférieure à 2, ce qui montre que les moyennes de ces deux groupes ne sont pas statistiquement différentes. Il est permis de conclure, en conséquence, que l'extrait épiphysaire ne détermine pas de rétention sodique chez le rat totalement surrénalectomisé.

III.- FRACTIONNEMENT DE CET EXTRAIT

A.- FORMULE PROVISOIRE D'UN DES COMPOSANTS

Un fractionnement préalable des extraits épiphysaires a été tenté (Mme A. RISTIC) et deux fractions ont été obtenues qui ont été désignées sous les indicatifs BEA et BEM. L'analyse par chromatographie sur papier de la première fraction BEA a montré qu'elle correspondait à des chaînes peptidiques, hydrolysables en amino-acides. La seconde fraction BEM ne contient, par contre, aucun amino-acide; les chromatographies sur plaques de silice-gel et de cellulose ont permis d'isoler dans BEM un corps cristallisable, se présentant sous la forme de fines aiguilles jaunâtres; cette tache est fluorescente en UV et donne une réaction positive à la diméthyl-amino-aldéhyde benzoïque, indiquant la présence d'un noyau indole.

Les micro-analyses de la fraction BEM (Institut Max Planck, MULHEIM-RHUR) ont montré qu'il s'agit d'un corps de formule brute = $C_{13}H_{21}O_4N_4P$, de poids moléculaire de 278, s'apparentant à la mélatonine (N - acétyl-5-méthoxy-tryptamine), isolée par A.B. LERNER et coll. (1958). Le BEM diffère de la Mélatonine par les faits suivants :

1.- Il contient un atome d'azote, au lieu de 2 pour la Mélatonine et

2.- Il contient un atome de phosphore

La Mélatonine a d'ailleurs été isolée de l'épiphyse de bovidés par RV. HEINZELMANN (120) en 1959.

Des recherches ultérieures seront nécessaires pour préciser la structure exacte de la fraction BEM épiphysaire.

B.- ETUDE EXPERIMENTALE DU B.E.M.

MATERIEL & METHODES :

Dans le présent travail, nous nous sommes proposés d'étudier d'une part, l'action de l'extrait épiphysaire global, de la fraction BEA et de la fraction BEM de ceux-ci; d'autre part, et pour comparaison, l'action du régime de privation et du régime de surcharge sodique. 30 rats mâles, de race Wister, pesant en moyenne 150/170 gr. ont été utilisés pour la présente expérimentation. Ils ont été subdivisés en 6 lots, de 5 animaux chacun. Ces lots se répartissent de la manière suivante :

Lot N°1 = 5 animaux témoins, recevant, pendant deux jours consécutifs, 1 injection intramusculaire du solvant des substances à étudier (0,5 cm³ de sérum physiologique).

Lot N°2 = 5 animaux recevant pendant deux jours 0,5 cm³ d'extrait épiphysaire total par jour. Cette quantité correspond à 0,5 g. d'épiphyse.

Lot N°3 = 5 animaux recevant, de la même manière, pendant 2 jours, 0,5 cm³ de l'extrait BEA.

Lot N°4 = 3 animaux recevant, dans les mêmes conditions, pendant 2 jours, 0,5 cm³ d'extrait BEM.

Les quatre lots d'animaux étaient placés dans des conditions identiques avec eau de boisson à volonté et biscuits complets pour rats. Au contraire, les deux lots suivants étaient placés dans des conditions différentes de régime :

Lot N°5 = 5 animaux ne recevant aucune injection, mais soumis, depuis 5 jours, à un régime strictement désodé, consistant en eau pure, biscottes sans sel et grains de blé.

Lot N°6 = 5 animaux recevant, depuis 5 jours, un régime de surcharge sodique, avec, pour eau de boisson, une solution à 1 % de chlorure de sodium et supplément de sel sur les biscuits.

Du point de vue de la technique histochimique, après sacrifice des animaux à l'éther, deux heures après la seconde injection de produit à étudier pour les lots 1 à 4 et après 5 jours de régime pour les lots 5 et 6, les surrénales ont été prélevées aussi rapidement que possible et fixées immédiatement dans le formol neutre salé (formol à 5 % dans la solution de chlorure de sodium à 0,9 %). La fixation est poursuivie pendant 16 heures à 4°C.

La fixation terminée, les surrénales sont lavées à l'eau courante pour chasser le formol et soupées à la congélation à 55. Pour mettre spécifiquement en évidence les estérases carboxyliques (aliestérases), nous avons utilisé le bain d'incubation de BURSTANE, dont la composition est la suivante :

| | |
|--|---------------------|
| acétate d' α naphthyle à 1 % dans le méthanol | 2 cm ³ |
| eau distillée glacée | 100 cm ³ |
| tampon Sörensen pH 8.0 | 5 cm ³ |
| o - dianisidine | 40 mg. |

Le bain d'incubation est à préparer extemporanément dans l'ordre indiqué ci-dessus. Les coupes de surrénale y sont incubés pendant dix minutes à l'étuve à 37°C. Elles sont ensuite lavées à l'eau distillée et montées à la gélatine glycinée. Par cette technique, les zones riches en aliestérases se colorent en rouge franc.

R E S U L T A T S

Chez les animaux témoins, les aliestérases sont présentes en faible quantité au niveau de la zone glomérulée; leur distribution, au niveau de cette zone, est irrégulière; l'enzyme est localisé dans le cytoplasme des cellules. Une faible réaction positive pour les aliestérases est retrouvée au niveau de certaines cellules de la zone fasciculée.

Chez les animaux du groupe 2, qui a reçu l'extrait total d'épiphyse, la réaction des aliestérases est beaucoup plus marquée. Cet accroissement de l'activité des estérases carboxyliques est strictement limité aux cellules de la zone glomérulée; les cellules de la zone fasciculée et de la zone réticulée ne présentent pas de différences sensibles avec les témoins. Ces faits confirment, avec encore plus de netteté, ce que nous avons constaté pour les phosphatases alcalines.

La surrénale des animaux du groupe 3, qui a reçu de l'extrait BEA, correspondant à la fraction peptidique de l'extrait épiphyseire, ne présente pas de différences avec celle des témoins; la distribution des aliestérases est identique à celle constatée chez les animaux témoins.

ACTION DE L'EXTRAIT EPIPHYSAIRE ET DES VARIATIONS DE LA

RATION SODIQUE SUR LA ZONE GLOMERULEE

| | <u>LIPIDES</u> | <u>PHOSPHATASE</u>
<u>ALCALINE</u> | <u>ALIESTERASES</u> |
|---------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------|
| 1.- TEMOINS | ++ | 0 | ++ |
| 2.- EPIPHYSE TOTALE | ++++ | ++ | +++ |
| 3.- BEA PEPTIDE | ++ | 0 | ++ |
| 4.- BEM (AGT) | +++++ | | +++++ |
| 5.- DEPRIVATION Na | ++++ | | ++++ |
| 6.- SURCHARGE Na | + | | + |

Les modifications les plus adcentuées de l'activité aliéstérasiqúeslocalisées à la zone glomérulée et strictement localisées à celle-ci sont observées chez les animaux du lot N°4 qui ont reçu l'extrait BEM. Chez ces animaux, l'activité aliéstérasiqúe de la zone glomérulée est si intense qu'il est impossible de préciser les limites des cellules de cette zone (). L'aspect de la glomérulée des animaux de ce lot est comparable à celle des animaux du lot N°5, qui ont été soumis à un régime désodé pendant 5 jours;chez ces derniers, l'activité aliéstérasiqúe est cependant légèrement moins intense que celle des surrénales des rats soumis à l'action des extraits BEM.

Par contre, la glomérulée des animaux soumis au régime de surcharge sodique était sensiblement comparable à celle des témoins.

IV.- D I S C U S S I O N

L'activité d'un extrait total de l'épiphyse aussi bien sur les images histochimiques de la zone glomérulée que sur la rétention sodique, est certaine.

Par contre, notre expérimentation sur les constituants purifiés souffrent de nombreuses critiques.

D'abord, le corps cristallisé (BEM) expérimenté n'est vraisemblablement pas un corps pur, car il est dissociable par certains montages chromatographiques.

Deuxièmement, il n'existe pas de certitude que l'échantillon expérimenté soit identique à l'échantillon sur lequel fut faite l'analyse chimique.

Troisièmement, les preuves histologiques sont indirectes et n'ont qu'une valeur d'orientation.

Quatrièmement, l'étude physiologique a porté sur un nombre réduit d'animaux et avec une technique elle-même sujette à caution (ligature de l'urèthre).

Ces raisons nous font considérer les résultats obtenus seulement comme un préalable encourageant.

Seule, l'expérimentation au long cours en cage métabolique, d'une part, l'étude biochimique et biologique de l'action des extraits sur les surrénales in vitro de l'autre, nous permettront de conclure.

B I B L I O G R A P H I E

101.- ALLEN J.M.

A chemical and histochemical study of aliesterase
in mouse adrenal cortex under hormonal influence and
altered sodium intake

Endocrinology 61 368 1957

102.- DESAULES P. et MEIER R.

Schweiz. Med. Wschr. 86 1060 1966

103.- FARRELL G.

Physiological factors which influence secretion
of aldosterone

Recent progr. Hormone Rec. 15 275 1959

104.- FARRELL G.

Steroidogenic properties of extracts of beef
diencephalon

Endocrinology 65 29 1959

105.- FARRELL G.

Glomerulotropic activity of an acetone extract of
pineal tissue

Endocrinology 65 239 1959

106.- FARRELL G.

Physiological factors which influence secretion of
aldosterone

Rec. Prog. Hormone Res. 15 275 1959

107 - FARRELL G. PRATT Ad. HARRISS L.S. et BANCKS R.C.

Preliminary characterisation of glomerulotrophin

41th. Meet. Endocr. Soc.

Atlantic City, June 4-6 - Abstract N°74 1959

108 - FARRELL G., KOLETSKY S. et LAPHAN L.W.

Decreased aldosterone secretion following pinealectomy

Fed. Proc. 18 - 44 1959

109 - FARRELL G.

Epiphysis cerebri in the control of steroid secretion

Fed. Proc. 19 601 1960

110 - FARRELL G.

Adrenoglomerulotropin - Symposium on salt and water metabolism

Circulation 21 (2) 1.009 1960

111 - FARRELL G.

The control of aldosterone secretion. Influence of the epiphysis cerebr.

First International Congress Endocrinology

Acta Endocr. (COPENHAGUE) Suppl. 50 1960

112 - GIROUD C.J.P., STACHANKO et VENNING Et.

Secretion of aldosterone by the zona glomerulosa of rat's adrenal glands incubated "in vitro"

Proc. Soc. Exp. Biol. 92 154 1956

113 - GIROUD C.P.J., STACHENKO et PILETTA

In vitro studies of the functional zonation of the cortex and of the production of aldosterone

Int. Symp. Aldosterone J.A. CHURCHILL Ed. LONDON 56 1958

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..

... ..

... ..

... ..
... ..

... ..

... ..
... ..

... ..

... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

114.- GIROUD C.P.J., SAFFRAN M., SCHALLY A.V., STACHENKO et VENNING RH.

Production of aldosterone by rat adrenal glands
"in vitro"

Proc. Soc. Ex. Biol. 92 855 1958

115.- GROSS F.

Renal and extra-renal actions of aldosterone and its
influence on sodium transport

First Intern. Congress Endocrinology COPENHAGUE
50 1960

116.- GANOND W.F., MULROW J.

Amer. Journ. Physiol. 195 337 1958

117.- GANOND W.F., LIEBERMANN A.H., DAILY W.J.R., YUEN V.S., MURLOW PJ.
LUECHTER J.A. Jr, BAILEY R.E.

Aldosterone secretion in dogs with hypothalamic
lesions

Endocrinology 65 18 1959

118.- GIARMAN N.J., FREEDMAN D.X.

Serotonin content of the pineal glands of man and
monkey

Nature (LONDON) 186 480 1960

119.- GILBERT G.J.

The subcommissural organ, a regulation of thirst

Am.J.Physiol.191 - 243 1957

120.- HEINZELMANN I.

Amer. Chem. Soc. 81 6084 1959

121.- KAGAWA C.M., SHIPLEY E.G. et MEYER R.K.

Proc. Soc. Exp. Biol. 80 281 1952

122.- KOVACS K., DAVID M., WEISS P.

Aldosteronotropic and corticostéronotropic substance
in the human brain

Orv. Hetil. 101, 1053

1960

123.- LERNER A.B., CASE J.D., TAKAHASHI Y.

Isolation of melatonin and 5 - methoxy - indole - 3 -
acetic - acid from bovin pineal glands

J.Biol. Chem. 235 - 1992

1960

124.- LUETSCHER J.A. Jr

A.M.A. Arch. Int. Med. 102

314

1958

125.- MARCUS S. ROMANOFF L.P. et PINCUS G.

Endocrinology 50

286

1952

126.- MULROW P.J., SHMAGRANOFF G.L., LIEBERMANN A.H., SLADE C.L. et
LUETSCHER J.A. Jr

Stimulation of rat - Adrenocortical secretion by a
factor present in human urine

Endocrinology 64

621

1959

127.- NEWMAN A.E., REDGATE E.S. et FARRELL G.

Effects of diencephalic mesencephalic lesions on al-
dosterone and hydrocortisone secretion

Endocrinology 63 - 723

1958

128.- NEWMAN A.E., REDGATE E.S., YATSU F.M. et FARRELL G.

Fed. Proc. 17

117

1958

129.- NIEMI M. IKONEN M.

Histochemical evidence of amino peptidase activity in
rat pineal gland

Nature (LONDON) - 185 - 928

1960

130 - NORMAN N.

First International Congress Endocrinology
Acta Endoc. (COPENHAGUE) Suppl; 50 1960

131 - ORTI E., ROLLI E.P., LAKEN B., DUMM E.

Fed. Proc. 15 148 1956

132.- PETERSDORF R.G. et WELT L.G.

The effect of an infusion of hyperoncotic albumin on
the excretion of water and solutes

J. Clin. Invest. 32 283 1953

133 - PRUNIER

Aldostérone

Thèse Médecine PARIS 1957

134 - RAUSCHKOLB E.W. et FARRELL G.

Evidence for diencephalic regulation of aldosterone
secretion

Endocrinology 59 526 1959

135 - ROLLI E.P., ORTI E., DUMM E., LAKEN B.

Amer. Journal Physiol. 191 323 1957

136 - ROMANI J.D., KELLER A. et PIOTTI L.E.

Soc. Endocr. Séance du 3/12/1959 1959

137 - ROMANI J.D., KELLER A. et PIOTTI L.E.

Soc. Endocr. 1960 Séance du 8/5/60)

138 - ROSS R.J., Mac LEAN E.K.

First International Congress Endocrinology

Acta Endoc. COPENHAGUE, Suppl. 50 1960

139 - STACHENKO J. et GIROUD C.J.P.

Functionnal zonation of the adrenal cortex :

Pathway of corticosteroid biogenesis

Endocrinology 64 730 1959

140 - SUARDI, CASIRALA G., RICOTTI V.

Action of an aqueous extract of pineal gland

Biol. Lat. 12 623 1959

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS

AND ARCHITECTURE

OFFICE OF THE DEAN

1100 EAST 58TH STREET

CHICAGO, ILLINOIS 60637

TEL: 773-936-5000

1990

C O N C L U S I O N S

Le nombre de travaux concernant l'aldostérone est devenu très important. De ce fait, nous avons été obligés de limiter sévèrement l'objet de notre étude.

En particulier, le système antidiurétique, la sérotonine, les antialdostérone, les facteurs excréteurs de sodium, ainsi que la biogenèse et l'excrétion de l'aldostérone, ont été exclus de notre travail.

1.- La Volémie et Les Volorécepteurs

Il existe de nombreux moyens expérimentaux qui permettent de réaliser une fuite sodique par l'augmentation isolée de la volémie. Ce sont :

- des perfusions salées hypotoniques de grand volume, des perfusions hyperoncotiques d'albumine, des transfusions, enfin l'hormone antidiurétique.

D'une façon symétrique, l'hypovolémie isolée provoque une rétention sodique, par l'augmentation de la sécrétion de l'aldostérone. Elle a pu être réalisée par :

- la mise des garrots aux membres inférieurs,
- des saignées,
- les hypovolémies au cours des congestions veineuses,
- la diminution du retour veineux par l'orthostatisme.

Il existe des preuves expérimentales directes que :

1° - au niveau de l'oreillette droite se situe un système qui normalise la sécrétion de l'aldostérone lorsque la volémie redevient normale après une hypovolémie expérimentale.

2° - Les informations émises par ce système sont transmises par les nerfs pneumo-gastriques.

3° - A la jonction thyro-carotidienne se trouve un autre système volo ou baro-récepteur qui entraîne l'hyperaldostéronémie lorsque la volémie diminue à son niveau.

Nous illustrons ce chapitre par quelques exemples cliniques.

2.- Les Centres régulateurs supérieurs

de la sécrétion de l'Aldostérone

HYPOPHYSE

Le rôle de l'hypophyse dans la sécrétion de l'aldostérone a d'abord été nié car : les animaux hypophysectomisés présentent une aldostéronémie résiduelle importante; l'A.C.T.H. ne provoque qu'une faible réponse aussi bien de la zone sécrétrice que de l'hormone elle-même (in vivo et in vitro).

Par contre, au cours des hyperaldostéronismes secondaires expérimentaux, l'hypophysectomie provoque une chute de l'aldostéronémie - chute qui n'est annulée que par l'injection d'A.C.T.H.

Il s'agit donc d'un rôle certain masqué dans les conditions habituelles par d'autres moyens d'homéostasie et qui ne devient apparent qu'au cours de conditions particulières qui exigent des efforts adaptatifs.

Sont rapportées des observations cliniques d'une hypophysectomie, d'un panhypopituitarisme, de l'action de l'A.C.T.H. chez un sujet normal.

Centres dioencéphalo-mésencéphaliques

La mise en évidence de ces centres a été faite par décérébrations sélectives sur des animaux en homéostasie artificielle, et par des micro-lésions stéréotoxiques.

En pathologie humaine, des troubles isolés du métabolisme sodique ont été rapportés par des chirurgiens et des neuro-chirurgiens à la suite des traumatismes crâniens, des tumeurs ou anévrismes, des interventions de neuro-chirurgie.

Aldostéronurie dans certains dérèglements diencéphalo-hypophysaires,
repos et orthostatisme.-

Six malades présentant à la suite de "stressors" psychiques graves ou de déficit endocrinien périphérique (castration) des tableaux cliniques variés comprenant : des troubles de la faim, de la soif, du sommeil, de la température, un dysfonctionnement hypophysaire, des obésités importantes et d'évolution irrégulière, ont été étudiés par des dosages répétés de l'aldostéronurie.

Les chiffres trouvés au repos ne sont pas statistiquement différents de ceux de sujets témoins.

Par contre, la montée hyperaldostéronurique après l'épreuve est d'une ampleur significativement différente de celle du groupe témoin.

3.- Facteurs Hormonaux Aldostérono - Secréteurs

.....

Des auteurs ont pu mettre en évidence dans l'urine et le plasma des animaux et des sujets humains un principe aldostérono-sécréteur. La surrénalectomie et le régime désodé en augmentent la teneur.

FARRELL et son école, en préparant des extraits de micro-régions et par des artifices d'extraction et de purification, ont pu démontrer que : les fonctions A.C.T.H. et A.G.T.H. peuvent être séparées par des moyens physico-chimiques.

Le rôle essentiel dans la régulation de l'aldostérone est joué par des structures mésencéphaliques (commissure postérieure, corps subcommissural, épiphyse).

L'expérimentation d'un extrait épiphysaire aqueux, faite dans notre laboratoire, et antérieurement publiée, a donné les résultats suivants :

Les rats injectés pendant deux jours avec un extrait correspondant à 0 gr. 1 d'épiphyse fraîche présentent une couche glomérulée augmentée largement de volume, chargée en enclaves lipidiques, et avec une réaction Gomori positive (phosphatase alcaline), alors que les couches fasciculées et rétidulées sont identiques à celles des témoins.

Le même extrait provoque une rétention sodique statistiquement significative par rapport aux témoins, et non présentés par des animaux surrenalectomisés.

Le fractionnement de cet extrait a permis d'isoler des composés peptidiques et aussi

un corps cristallisé, de poids moléculaire réduit (278) présentant des réactions du noyau indole, et qui semble être un dérivé de la tryptamine, avec une esterification par l'acide phosphorique.

Ce corps a été expérimenté chez les rats et présente une activité A.G.T.H. très importante.

Ces résultats préliminaires nous ont paru encourageants, mais leur confirmation nécessitera une importante expérimentation complémentaire.

VU et PERMIS d'IMPRIMER :

Le RECTEUR de l'ACADEMIE de PARIS :

J. S A R R A I L H

Le DOYEN de la FACULTE de
MEDECINE de PARIS :

L. B I N E T

Le PRESIDENT de la THESE :

F A U V E R T

